



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXIII

C

25

ASOLI





XXXIII
C.
28.





DISCOURS
SUR LES
DIFFERENTES FIGURES
DES
ASTRES.

Par M. DE MAUPERTUIS,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL. 733-4331

1968



R

DISCOURS

SUR LES

DIFFERENTES FIGURES

DES

ASTRES.

*OU L'ON DONNE L'EXPLICATION DES TACHES
lumineuses qu'on a observées dans le Ciel : Des
Etoiles qui paroissent s'allumer & s'éteindre : De
celles qui paroissent changer de grandeur : De
l'Anneau de Saturne : Et des effets que peuvent
produire les Comètes.*

Par M. DE MAUPERTUIS.

Seconde Edition augmentée.



A PARIS, RUE S. JACQUES,
Chez G. MARTIN, JEAN-BAPTISTE COIGNARD
& les Freres GUERIN, Libraires.



M. DCC. XLII.
Avec Approbation & Privilege du Roi.



A
SON ALTESSE SERENISSIME
MONSEIGNEUR
L E
PRINCE PALATIN,
DUC DE DEUX-PONTS.

MONSEIGNEUR,

*Ce n'est point à l'éclat du
Souverain , mais aux vertus
du grand Homme que je rends
cet hommage.*

a

E P I T R E.

*Tout le monde a vû en vous
dès vos premières années la
prudence & la modération, qui
ne sont d'ordinaire les fruits
que de l'âge & de l'expérience.
Mais les bontés dont VOTRE
ALTESSE SERENISSIME
m'honore, m'ont procuré l'a-
vantage de voir de près l'éle-
vation de son ame, la droiture
de son cœur, l'étendue de son
esprit, enfin tout ce qui doit
se trouver dans le Sang de ces
Rois qui ont fait l'admiration
de l'Europe. Et si la plume
d'un Géometre est trop aride*

E P I T R E.

*pour louer dignement de si
grandes qualités, la reconnois-
sance ne lui permettoit point
de les admirer dans le silence,
& l'amour de la vérité dont il
fait profession, doit lui faire
pardonner un mot qui lui en est
échappé.*

*Je suis avec un très-profond
respect,*

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE SERENISSIME

*Le très-humble & très-obéissant
serviteur, MAUPERTUIS.*



AVERTISSEMENT

S U R

CETTE SECONDE EDITION.

J'A V O I S entrepris dans cet
Ouvrage d'expliquer plu-
sieurs Phénomènes du Ciel,
qui ne me paroïssent point
avoir encore été expliqués d'u-
ne maniere satisfaisante. Pour-
quoi l'on a vû quelquefois
de nouvelles Etoiles s'allumer
dans les Cieux? Pourquoi l'on
en a vû d'anciennes s'étein-
dre? Pourquoi quelques-unes
paroissent changer de gran-
a ij

AVERTISSEMENT.

deur, & ont des alternatives d'augmentation & de diminution de lumière ? Enfin pourquoi Saturne est environné d'un Anneau suspendu en forme de voute autour de lui ?

Non-seulement j'ai cru les explications que je donnois de tous ces Phénomènes assez naturelles ; mais je les ai vû confirmées par de nouvelles Observations. Et il semble qu'on ait apperçû en Angleterre ce que je n'avois fait que conjecturer. C'est là ce qui a donné lieu à une addition que

AVERTISSEMENT.

j'ai faite à cet Ouvrage , que j'ai tirée de ce que j'avois donné dans les Mémoires de l'Académie.

J'ai aussi changé quelque chose dans l'ordre. Pour que ce Livre puisse être lû de tout le monde & tout de suite , je n'y ai laissé aucuns calculs : je les ai renvoyés , comme les preuves Mathématiques de ce que j'établis , dans un *Appendix* que ceux qui voudront s'en donner la peine , pourront consulter.

TABLE

DES CHAPITRES.

CHAP. I. <i>REFLEXIONS</i> generales sur la Figure de la Terre,	pag. I
II. <i>Discussion métaphysique sur l'Attrac- tion,</i>	16
III. <i>Système des Tourbillons, pour expliquer le mouvement des Planetes, & la pesan- teur des Corps vers la Terre,</i>	41
IV. <i>Système de l'Attraction, pour expliquer les mêmes Phénomènes,</i>	64
V. <i>Des différentes loix de la pesanteur, & des figures qu'elles peuvent donner aux Corps célestes,</i>	88
VI. <i>Taches lumineuses découvertes dans le Ciel,</i>	102
VII. <i>Des Etoiles qui s'allument, ou qui s'é- teignent dans les Cieux; & de celles qui changent de grandeur,</i>	114
VIII. <i>De l'Anneau de Saturne;</i>	124

<i>CALCUL des Figures que doivent prendre les Fluides qui tournent autour de leur Axe,</i>	<i>134</i>
<i>PROPOSITION pour trouver le rapport de la Pesanteur à la force centrifuge sur l'E- quateur des Astres,</i>	<i>137</i>
<i>PROPOSITION pour trouver les Figures des Astres,</i>	<i>146</i>
<i>PROPOSITION pour trouver la Figure des Anneaux qui peuvent se former autour des Astres,</i>	<i>160</i>

PRIVILEGE DU ROY.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Con-
seillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Séné-
chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos
Justiciers, qu'il appartiendra, SALUT. Notre Aca-
DEMIE ROYALE DES SCIENCES Nous a très-humble-
ment fait exposer, que depuis qu'il Nous a plu lui
donner par un Reglement nouveau de nouvelles
marqués de notre affection, Elle s'est appliquée
avec plus de soin à cultiver les Sciences, qui sont
l'objet de ses exercices; ensorte qu'outre les Ou-

vrages qu'elle a déjà donnés au Public, Elle seroit en état d'en produire encore d'autres, & Nous plaîtoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilège, attendu que celles que Nous lui avons accordées en date du six Avril 1693. n'ayant point eû de temps limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre Conseil d'Etat, du 13. Aoust 1704. celles de 1713. & celles de 1717. étant aussi expirées; & désirant donner à notredite Académie en corps & en particulier, & à chacun de ceux qui la composent, toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public, Nous avons permis & permettons par ces Présentes à notredite Académie, de faire vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéissance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'elle voudra choisir, *Toutes les Recherches ou Observations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les assemblées de notredite Académie Royale des Sciences; comme aussi les Ouvrages, Memoires, ou Traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils sont dignes de l'impression; & ce pendant le temps & espace de quinze années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes.* Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance: comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun desdits Ouvrages ci-dessus spécifiés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'au-

gmentation , correction , changement de titre ,
feuilles même séparées , ou autrement , sans la
permission expresse & par écrit de notredite Aca-
démie , ou de ceux qui auront droit d'Elle , & ses
ayans cause , à peine de confiscation des Exem-
plaires contrefaits , de dix mille livres d'amende
contre chacun des Contrevenans , dont un tiers
à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , l'autre
tiers au Dénonciateur , & de tous dépens , dom-
mages & intérêts : à la charge que ces Présentes
seront enregistrées tout au long sur le Registre de
la Communauté des Imprimeurs & Libraires de
Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que
l'impression desdits Ouvrages sera faite dans no-
tre Royaume & non ailleurs , & que notredite
Académie se conformera en tout aux Reglemens
de la Librairie , & notamment à celui du 10.
Avril 1725. & qu'avant que de les exposer en
vente , les Manuscrits ou Imprimés qui auront
servi de copie à l'impression desdits Ouvrages ,
seront remis dans le même état , avec les Appro-
bations & Certificats qui en auront été donnés ,
ès mains de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France , le sieur Chauvelin ;
& qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothèque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin :
le tout à peine de nullité des Présentes : du con-
tenu desquelles vous mandons & enjoignons de
faire jouir notredite Académie , ou ceux qui au-
ront droit d'Elle & ses ayans cause , pleinement
& paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait
aucun trouble ou empêchement : Voulons que la
Copie desdites Présentes qui sera imprimée tout

au long au commencement ou à la fin dedit
Ouvrages, soit tenue pour dument signifiée, &
qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés
& féaux Conseillers & Secretaires foi soit ajoutée
comme à l'Original: Commandons au premier
notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécu-
tion d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans
demander autre permission, & nonobstant cla-
meur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce
contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Fon-
tainebleau le douzième jour du mois de Novem-
bre, l'an de grace mil sept cent trente-quatre, &
de notre Regne le vingtième. Par le Roi en son
Conseil. Signé, SAINSON.

*Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Roya-
le & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Pa-
ris, num. 792. fol. 775. conformément aux Régle-
mens de 1723. qui font défenses, Art. IV. à toutes
personnes de quelque qualité & condition qu'elles
soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de
vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leur nom, soit qu'ils s'en disent les Au-
teurs ou autrement, & à la charge de fournir les
Exemplaires prescrits par l'Art. CVIII. du même
Règlement. A Paris le 15. Novembre 1734.*

G. MARTIN, Syndic.

DISCOURS








DISCOURS

S U R

LES DIFFERENTES FIGURES

D E S

CORPS CELESTES.



C H A P I T R E I.

*Refléxions générales sur la figure de
la Terre.*

DEPUIS les temps les plus reculés, on a crû la Terre sphérique, malgré l'apparence qui nous représente sa surface comme platte,

A

2 F I G U R E

lorsque nous la considérons du milieu des Plaines ou des Mers ; cette apparence ne peut tromper que les gens les plus grossiers ; les Philosophes , d'accord avec les Voyageurs , se réunissent à regarder la Terre comme sphérique. D'une part , les Phénomènes dépendant d'une telle forme , & de l'autre une espèce de régularité , avoient empêché d'avoir aucun doute sur cette sphéricité ; cependant à considérer la chose avec exactitude , ce jugement que l'on porte sur la sphéricité de la Terre , n'est guères mieux fondé que celui qui feroit croire qu'elle est plate , sur l'apparence grossière qui la représente ainsi : car quoique

les Phénomènes nous fassent voir que la Terre est ronde , ils ne nous mettent cependant pas en droit d'affurer que cette rondeur soit précisément celle d'une Sphère.

En 1672. M. Richer étant allé à la Cayenne , pour faire des Observations astronomiques , trouva que l'Horloge à pendule qu'il avoit réglée à Paris sur le moyen mouvement du Soleil retardoit considérablement. Il étoit facile de conclure de là que le Pendule qui battoit les Secondes à Paris , devoit être raccourci pour les battre à la Cayenne.

Si l'on fait abstraction de la résistance que l'Air apporte au mou-

4 F I G U R E

vement d'un Pendule , (comme on le peut faire ici sans erreur sensible) la durée des Oscillations d'un Pendule qui décrit des Arcs de Cycloïde , ou , ce qui revient au même , de très-petits Arcs de Cercle , dépend de deux causes ; de la force avec laquelle les Corps tendent à tomber perpendiculairement à la surface de la Terre , & de la longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant la même , la durée des Oscillations ne dépend donc plus que de la force qui fait tomber les Corps , & cette durée devient d'autant plus longue que cette force devient plus petite.

La longueur du Pendule n'a-

DES ASTRES. 5

voit point changé de Paris à la Cayenne : car quoiqu'une verge de métal s'allonge à la chaleur, & devienne par là un peu plus longue, lorsqu'on la transporte vers l'Equateur ; cet allongement est trop peu considérable pour qu'on lui puisse attribuer le retardement des Oscillations, tel qu'il fut observé par M. Richer ; cependant les Oscillations étoient devenues plus lentes, il falloit donc que la force qui fait tomber les Corps fût devenue plus petite ; le poids d'un même Corps étoit donc moindre à la Cayenne qu'à Paris.

Cette observation étoit peut-être plus singulière que toutes celles qu'on s'étoit proposées ;

A iij

6 F I G U R E

on vit bientôt cependant qu'elle n'avoit rien que de conforme à la Théorie des forces centrifuges, & que l'on n'eût, pour ainsi dire, dû prévoir.

Une force secrète qu'on appelle *pesanteur*, attire ou chasse les Corps vers le centre de la Terre. Cette force, si on la suppose par tout la même, rendroit la Terre parfaitement sphérique, si elle étoit composée d'une matiere fluide & homogene; & qu'elle n'eût aucun mouvement: car il est évident qu'afin que chaque colonne de ce fluide, prise depuis le centre jusqu'à la superficie, demeurât en équilibre avec les autres, il faudroit que son poids fût égal au poids

de chacune des autres; & puis-
que la matiere est supposée ho-
mogene, il faudroit pour que
le poids de chaque colonne fût
le même, qu'elles fussent toutes
de même longueur. Or il n'y
a que la Sphère, dans laquelle
cette propriété se puisse trouver;
la Terre seroit donc parfaite-
ment sphérique.

Mais c'est une Loi pour tous
les Corps qui décrivent des
Cercles, de tendre à s'éloigner
du centre du Cercle qu'ils dé-
crivent, & cet effort qu'ils font
pour cela, s'appelle *force centri-
fuge*; l'on sçait encore que si
des Corps égaux décrivent dans
le même tems des Cercles dif-
férens, leurs forces centrfu-

ges font proportionnelles aux Cercles qu'ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler autour de son axe, chacune de ses parties acquerra une force centrifuge, d'autant plus grande que le Cercle qu'elle décrira fera plus grand, c'est-à-dire, d'autant plus grande, qu'elle sera plus proche de l'Equateur, cette force allant s'annéantir aux Poles.

Or, quoiqu'elle ne tende directement à éloigner les parties du centre de la Sphère, que sous l'Equateur; & que par-tout ailleurs elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu'elles décrivent; cependant en décomposant cette force,

déjà d'autant moindre qu'elle s'exerce moins proche de l'Equateur, on trouve qu'il y en a une partie qui tend toujours à éloigner les parties du fluide du centre de la Sphère.

Or en cela cette force est absolument contraire à la pesanteur, & en détruit une partie plus ou moins grande, selon le rapport qu'elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à descendre, résultant de la pesanteur inégalement diminuée par la force centrifuge, ne fera plus la même par-tout, & fera dans chaque lieu d'autant moins grande, que la force centrifuge l'aura plus diminuée.

Nous avons vu que c'est sous

l'Equateur que la force centrifuge est la plus grande ; c'est donc là qu'elle détruira une plus grande partie de la pesanteur. Les Corps tomberont donc plus lentement sous l'Equateur que par-tout ailleurs ; les Oscillations du Pendule seront d'autant plus lentes , que les lieux approcheront plus de l'Equateur ; & la Pendule de M. Richer , transportée de Paris à la Cayenne , qui n'est qu'à $4^{\text{d}} 55'$ de l'Equateur , devoit retarder.

Mais la force qui fait tomber les Corps , est celle-là même qui les rend pesants : & de ce qu'elle n'est pas la même par-tout , il s'ensuit que toutes nos

DES ASTRES. II

colonnes fluides , si elles sont égales en longueur, ne peseront pas par-tout également; la colonne qui répond à l'Equateur pesera moins que celle qui répond au Pole ; il faudra donc pour qu'elle soutienne celle du Pole en équilibre , qu'elle soit composée d'une plus grande quantité de matière , il faudra qu'elle soit plus longue.

La Terre sera donc plus élevée sous l'Equateur que sous les Poles ; & d'autant plus aplatie vers les Poles que la force centrifuge sera plus grande par rapport à la pesanteur , ou, ce qui revient au même , la Terre sera d'autant plus aplatie , que sa révolution sur son axe sera plus

rapide , car la force centrifuge dépend de cette rapidité.

Cependant si la pesanteur est uniforme , c'est-à-dire , la même à quelque distance que ce soit du centre de la Terre , comme M. Huygens l'a supposé , cet aplatissement a ses bornes. Il a démontré que si la Terre tournoit sur son axe environ dix-sept fois plus vite qu'elle ne fait , elle recevrait le plus grand aplatissement qu'elle pût recevoir , qui iroit jusqu'à rendre le diamètre de son Equateur double de son axe. Une plus grande rapidité dans le mouvement de la Terre , communiqueroit à ses parties une force centrifuge plus grande que leur pesan-

teur , & elles se dissiperoient.

M. Huygens ne s'en tint pas là ; ayant déterminé le rapport de la force centrifuge sous l'Equateur à la pesanteur , il déterminâ la figure que doit avoir la Terre ; & trouva que le diamètre de son Equateur devoit être à son axe comme 578 à 577.

Cependant M. Newton partant d'une Théorie différente , & considérant la pesanteur comme l'effet de l'attraction des parties de la matière , a déterminé le rapport entre le diamètre de l'Equateur & l'Axe qu'il trouve l'un à l'autre comme 230 à 229.

M. Herman a recherché aussi la figure de la Terre dans l'hy-

pothèse d'une pesanteur proportionnelle à la distance au centre , & a trouvé que la Terre devoit être une Ellipsoïde , dont le diamètre de l'Équateur seroit à l'axe comme $\sqrt{289}$ à $\sqrt{288}$. Ce qui approche fort du rapport déterminé par M. Huygens.

Aucune de ces mesures ne s'accorde avec la mesure actuellement prise par M^{rs} Cassini & Maraldi ; mais si de leurs Observations , les plus fameuses qui se soient peut-être jamais faites , il résulte que la Terre , au lieu d'être un Sphéroïde aplati vers les Poles , est un Sphéroïde allongé , quoique cette figure ne paroisse pas s'accorder avec les

DES ASTRES. 15

Loix de la Statique, il faudroit voir qu'elle est absolument impossible, avant que de porter atteinte à de telles Observations.

Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j'eusse été au Nord avec Mrs Clairaut, Camus, le Monnier, pour y mesurer le degré du Meridien. Nos mesures sont contraires à celles-ci & font la Terre applatie.



CHAPITRE II.

Discussion métaphysique sur l'Attraction.

LEs figures des Corps célestes dépendent de la pesanteur & de la force centrifuge. Sur cette dernière, il n'y a aucune diversité de sentimens parmi les Philosophes ; il n'en est pas ainsi de la pesanteur.

Les uns la regardent comme l'effet de la force centrifuge de quelque matière qui circulant autour des corps vers lesquels les autres pesent, les chasse vers le centre de sa circulation ; les autres sans en rechercher la cause,

se , la regardent comme si elle étoit une propriété inhérente au corps.

Quoique les Solutions mathématiques des Problemes que l'on trouvera dans ce discours, soient indépendantes de la nature de la pesanteur, cependant comme l'application que j'en fais aux phénomènes de la Nature, en dépend en quelque sorte, je crois nécessaire d'en dire ici quelque chose, afin de faire voir jusqu'où peuvent aller nos explications, selon les différentes idées qu'on peut avoir de la pesanteur.

Ce n'est pas à moi de prononcer sur une question qui partage les plus grands Philosophes;

B

mais il m'est permis de comparer leurs idées.

Un corps en mouvement qui en rencontre un autre , a la force de le mouvoir. Les Cartésiens tâchent de tout expliquer par ce principe , & de faire voir que la pesanteur même n'en est qu'une suite. En cela le fond de leur systême a l'avantage de la simplicité ; mais il faut avouer que dans le détail des phénomènes , il se trouve de grandes difficultés.

M. Newton peu satisfait des explications que les Cartésiens donnent des phénomènes par la seule impulsion , établit dans la Nature un autre principe d'action ; c'est que les parties de la

matiere pesent les unes vers les autres. Ce principe établi , M. Newton explique merveilleusement tous les phénomènes ; & plus on détaille , plus on approfondit son système , & plus il paroît confirmé. Mais outre que le fond du système est moins simple , parce qu'il suppose deux principes ; un principe par lequel les corps éloignés , agissent les uns sur les autres , paroît difficile à admettre.

Le mot d'attraction a effarouché les Esprits ; plusieurs ont craint de voir renaître dans la Philosophie , la doctrine des qualités occultes.

Mais c'est une justice qu'on doit rendre à M. Newton , il n'a

jamais regardé l'attraction comme une explication de la pesanteur des corps les uns vers les autres : il a souvent averti qu'il n'employoit ce terme que pour désigner un fait, & non point une cause ; qu'il ne l'employoit que pour éviter les systêmes & les explications ; qu'il se pouvoit même que cette tendance fût causée par quelque matière subtile qui sortiroit des corps, & fût l'effet d'une véritable impulsion ; mais que quoi que ce fût, c'étoit toujours un premier fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en dépendent. Tout effet réglé, quoique sa cause soit inconnue, peut être l'objet des

Mathématiciens , parce que tout ce qui est susceptible de plus & de moins , est de leur ressort , quelle que soit sa nature ; & l'usage qu'ils en feront , fera tout aussi sûr que celui qu'ils pourroient faire d'objets dont la Nature feroit absolument connue. S'il n'étoit permis d'en traiter que de tels , les bornes de la Philosophie feroient étrangement resserrées.

Galilée , sans connoître la cause de la pesanteur des corps vers la Terre , n'a pas laissé de nous donner sur cette pesanteur , une Théorie très-belle & très-sûre , & d'expliquer les phénomènes qui en dépendent. Si les corps pesent encore les uns vers les

autres , pourquoi ne feroit-il pas permis aussi de rechercher les effets de cette pesanteur , sans en approfondir la cause ? Tout se devoit donc réduire à examiner s'il est vrai que les corps aient cette tendance les uns vers les autres : & si l'on trouve qu'ils l'ayent en effet , on peut se contenter d'en déduire l'explication des phénomènes de la Nature , laissant à des Philosophes plus sublimes , la recherche de la cause de cette Force.

Ce parti me paroîtroit d'autant plus sage , que je ne crois pas qu'il nous soit permis de remonter aux premières causes , ni de comprendre comment les corps agissent les uns sur les au-

Mais quelques uns de ceux qui rejettent l'attraction, la regardent comme un Monstre métaphysique ; ils croient son impossibilité si bien prouvée , que quelque chose que la Nature semblât dire en sa faveur , il vaudroit mieux consentir à une ignorance totale , que de se servir dans les explications d'un principe absurde. Voyons donc si l'attraction , quand même on la considéreroit comme une propriété de la matière , renferme quelque absurdité.

Si nous avons des corps les idées complètes ; que nous con-
 nussions bien ce qu'ils sont en eux-mêmes, & ce que leur sont leurs propriétés ; comment , &

en quel nombre elles y résident ; nous ne serions pas embarrassés pour décider si l'attraction est une propriété de la matière. Mais nous sommes bien éloignés d'avoir de pareilles idées ; nous ne connoissons les corps que par quelques propriétés , sans connoître aucunement le sujet dans lequel ces propriétés se trouvent réunies.

Nous appercevons quelques assemblages différens de ces propriétés ; & cela nous suffit pour désigner les idées de tels ou tels corps particuliers. Nous avançons encore un pas ; nous distinguons différens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant que les unes va-

rient dans différents corps, quelques autres s'y retrouvent toujours les mêmes. Et de là nous regardons celles-ci comme des propriétés primordiales, & comme les bases des autres.

La moindre attention fait reconnoître que l'étendue est une de ces propriétés invariables. Je la retrouve si universellement dans tous les corps, que je suis porté à croire que les autres propriétés ne peuvent subsister sans elle, & qu'elle en est le soutien.

Je trouve aussi qu'il n'y a point de corps qui ne soit solide ou impénétrable; je regarde donc encore l'impénétrabilité comme une propriété essentielle de la matière.

Mais y a-t-il quelque connexion nécessaire entre ces propriétés ? l'étendue ne sçauroit-elle subsister sans l'impénétrabilité ? devois-je prévoir par la propriété d'étendue, quelles autres propriétés l'accompagneroient ? c'est ce que je ne vois en aucune manière.

Après ces propriétés primitives des corps , j'en découvre d'autres qui , quoiqu'elles n'appartiennent pas toujours à tous les corps , leur appartiennent cependant toujours , lorsqu'il sont dans un certain état ; je veux parler ici de la propriété qu'ont les corps en mouvement, de mouvoir les autres qu'ils rencontrent.

Cette propriété , quoique moins universelle que celles dont nous avons parlé , puisqu'elle n'a lieu qu'autant que le corps est dans un certain état , peut cependant être prise en quelque manière pour une propriété générale relativement à cet état , puisqu'elle se trouve dans tous les corps qui sont en mouvement.

Mais encore un coup , l'assemblage de ces propriétés étoit-il nécessaire ? Et toutes les propriétés générales des corps se réduisent-elles à celle-ci ? Il me semble que ce feroit mal raisonner que de vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir

assigner aux corps d'autres propriétés que celles que l'expérience nous a appris qui s'y trouvent ; mais on le feroit peut-être davantage de vouloir , après un petit nombre de propriétés à peine connues , prononcer dogmatiquement l'exclusion de toute autre ; comme si nous avions la mesure de la capacité des sujets , lorsque nous ne les connoissons que par ce petit nombre de propriétés.

Nous ne sommes en droit d'exclure d'un sujet , que les propriétés contradictoires à celles que nous savons qui s'y trouvent ; la mobilité se trouvant dans la matière , nous pouvons dire que l'immobilité ne s'y

trouve pas ; la matière étant impénétrable , n'est pas pénétrable. Propositions identiques, qui font tout ce qui nous est permis ici.

Voilà les seules propriétés, dont on peut assurer l'exclusion. Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoissons , ont-ils encore celle de peser, ou tendre les uns vers les autres ? ou de &c ? C'est à l'expérience à qui nous devons déjà la connoissance des autres propriétés des corps, à nous apprendre s'ils ont encore celle-ci.

Je me flatte qu'on ne m'arrêtera pas ici , pour me dire que cette propriété dans les corps,

de peser les uns vers les autres , est moins concevable que celles que tout le monde y reconnoît. La maniere dont les propriétés résident dans un Sujet est toujours inconcevable pour nous. Le Peuple n'est point étonné lorsqu'il voit un corps en mouvement , communiquer ce mouvement à d'autres ; l'habitude qu'il a de voir ce phénomène , l'empêche d'en appercevoir le merveilleux ; mais des Philosophes assés déterminés pour vouloir décider *à priori* , quelles propriétés peuvent se trouver dans les corps , & quelles doivent en être bannies ; de pareils Philosophes, dis-je, n'ont garde de croire que la force im-

pulsive soit plus concevable que l'attractive. Qu'est-ce que cette force impulsive ? comment réside-t-elle dans les corps ? qui eut pû deviner qu'elle y réside avant que d'avoir vû des corps se choquer ? la résidence des autres propriétés dans les corps n'est pas plus claire. Comment l'im-pénétrabilité, & les autres propriétés viennent-elles se joindre à l'étendue ? Ce seront-là toujours des myſteres pour nous.

Mais, dira-t-on peut-être, les corps n'ont point la force impulsive. Un corps n'imprime point le mouvement au corps qu'il choque ; c'est Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a établi des loix

pour la communication de ces mouvements. Ici l'on se rend fans s'en appercevoir. Si les corps en mouvement n'ont point la propriété d'en mouvoir d'autres ; si lorsqu'un corps en choque un autre , celui-ci n'est mû que parce que Dieu le meut, & s'est établi des loix pour cette distribution de mouvement ; de quel droit pourroit-on assurer que Dieu n'a pû vouloir établir de pareilles loix pour la Tendence. Dès qu'il faut recourir à un Agent tout puissant , & que le seul contradictoire arrête , il faudroit que l'on dît que l'établissement de pareilles loix renfermoit quelque contradiction ; mais c'est ce qu'on ne pourra

pourra pas dire ; & alors, est-il plus difficile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l'un vers l'autre deux corps éloignés , que d'attendre , pour le mouvoir , qu'un corps ait été rencontré par un autre.

Voici un autre raisonnement qu'on peut faire contre l'attraction. L'impénétrabilité des corps est une propriété dont les Philosophes de tous les partis conviennent. Cette propriété posée , un corps qui se meut vers un autre ne sçauroit continuer de se mouvoir , s'il ne le pénètre ; mais les corps sont impénétrables ; il faut donc que Dieu établisse quelque loi qui accorde le mouvement de l'un avec

C

l'impénétrabilité des deux ; voilà donc l'établissement de quelque loi nouvelle devenu nécessaire dans le cas du choc. Mais deux corps demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu'il y ait aucune nécessité d'établir de nouvelle loi.

Ce raisonnement est, ce me semble, le plus solide que l'on puisse faire contre l'attraction. Cependant quand on n'y répondroit rien, il ne prouve autre chose , si ce n'est qu'on ne voit pas de nécessité dans la tendance des corps ; ce n'est pas là non plus ce que je prétends établir ici ; je me suis borné à faire voir que cette tendance est possible.

Mais examinons ce raisonnement. Les différentes propriétés des corps ne sont pas, comme nous l'avons vû, toutes du même ordre; il y en a de primordiales qui appartiennent à la matière en général, parce que nous les y retrouvons toujours, comme l'étendue & l'impénétrabilité.

Il y en a d'un ordre moins nécessaire, & qui ne sont que des états dans lesquels tout corps peut se trouver, ou ne se pas trouver, comme le repos & le mouvement.

Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui désignent les corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, &c.

Cij

S'il arrive que quelques propriétés de différents ordres se trouvent en opposition , (car deux propriétés primordiales ne sçauroient s'y trouver) il faudra que la propriété inférieure cede , & s'accommode à la plus nécessaire , qui n'adme aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorsqu'un corps se meut vers un autre , dont l'impénétrabilité s'oppose à son mouvement. L'impénétrabilité subsistera inaltérablement ; mais le mouvement , qui n'est qu'un état dans lequel le corps se peut trouver , ou ne se pas trouver , & qui peut varier d'une infinité de manières , s'accommodera à l'impéné-

trabilité; parce que le corps peut se mouvoir, ou ne se mouvoir pas; il peut se mouvoir d'une manière ou d'une autre; mais il faut toujours qu'il soit impénétrable, & impénétrable de la même manière. Il arrivera donc dans le mouvement du corps quelque phénomène, qui fera la suite de la subordination entre les deux propriétés.

Mais si la pesanteur étoit une propriété du premier ordre; si elle étoit attachée à la matière, indépendamment des autres propriétés; nous ne verrions pas que son établissement fût nécessaire, parce qu'elle ne le devoit point à la combinaison d'autres propriétés antérieures.

Faire contre l'attraction le raisonnement que nous venons de rapporter , c'est comme si , de ce qu'on est en état d'expliquer quelque phénomène , on concluoit que ce phénomène est plus nécessaire que les premières propriétés de la matière ; sans faire attention que ce phénomène ne subsiste qu'en conséquence de ces premières propriétés.

Tout ce que nous venons de dire , ne prouve pas qu'il y ait d'attraction dans la Nature ; je n'ai pas non plus entrepris de le prouver. Je ne me suis proposé que d'examiner si l'attraction , quand même on la considéreroit comme une propriété inhé-

rente à la matière , étoit métaphysiquement impossible. Si elle étoit telle , les phénomènes les plus pressants de la Nature , ne pourroient pas la faire recevoir. Mais si elle ne renferme ni impossibilité ni contradiction , on peut librement examiner si les phénomènes la prouvent ou non. L'attraction n'est plus, pour ainsi dire , qu'une question de fait; c'est dans le système de l'Univers qu'il faut aller chercher, si c'est un principe qui ait effectivement lieu dans la Nature ; jusqu'à quel point il est nécessaire pour expliquer les phénomènes ; ou enfin s'il est inutilement introduit pour expliquer des faits que l'on explique bien sans lui.

Dans cette vûe , je crois qu'il ne fera pas inutile de donner ici quelque idée des deux grands Syftemes qui partagent aujourd'hui le Monde philosophe. Je commencerai par le Syfteme des Tourbillons , non feulement tel que M. Descartes l'établit , mais avec tous les raccommodements qu'on y a faits.

J'exposerai ensuite le Syfteme de M. Newton, autant que je le pourrai faire , en le dégageant de ces Calculs qui font voir l'admirable accord qui regne entre toutes ses parties , & qui lui donne tant de force.

CHAPITRE III.

*Système des Tourbillons pour expliquer
le mouvement des Planetes, & la
pesanteur des corps vers la Terre.*

POUR expliquer les mouvements des Planetes autour du Soleil, M. Descartes les suppose plongées dans un fluide, qui circulant lui-même autour de cet Astre, forme le vaste Tourbillon dans lequel elles sont entraînées, comme des vaisseaux abandonnés au courant d'un fleuve.

Cette explication, fort simple au premier coup d'œil, se trouve sujette à de grands in-

conveniens, lorsqu'on l'examine.

Les Planètes se meuvent autour du Soleil, mais avec certaines circonstances qu'il ne nous est plus permis d'ignorer.

Les routes que tiennent les Planètes ne sont pas des Cercles, mais des Ellipses, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix de la révolution, est que si l'on conçoit du lieu d'où une Planète est partie; & du lieu où elle se trouve actuellement, deux lignes droites tirées au Soleil, l'aire du Secteur elliptique, formé par ces deux lignes, & par la portion de l'Ellipse que la Planète a parcourue, croît en même proportion que le temps

qui s'écoule pendant le mouvement de la Planete. De là vient cette augmentation de vitesse qu'on observe dans les Planetes lorsqu'elles s'approchent du Soleil : les droites tirées des lieux de la Planete au Soleil , étant alors plus courtes , afin que les aires décrites pendant un certain temps soient égales aux aires décrites dans le même temps , lorsque la Planete étoit plus éloignée du Soleil , il faut que les Arcs elliptiques parcourus par la Planete soient plus grands.

Toutes les Planetes que nous connoissons suivent cette loi ; non-seulement les Planetes principales , qui font leur révolution autour du Soleil , mais encore

les Planetes secondaires, qui font leur révolution autour de quelque autre Planete , comme la Lune & les Satellites de Jupiter & de Saturne ; mais ici les aires qui sont proportionnelles aux temps, sont les aires décrites autour de la Planete principale, qui est à l'égard de ses Satellites , ce qu'est le Soleil à l'égard des Planetes du premier ordre. Par cette loi ; l'Orbite d'une Planete , & le temps de sa révolution étant connus , on peut trouver à chaque instant le lieu de l'Orbite où la Planete se trouve.

Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution de chaque Planete , & sa distance au Soleil ; & cette loi

n'est pas moins exactement observée que l'autre. C'est que le temps de la révolution de chaque Planete autour du Soleil, est proportionnel à la racine quarree du cube de sa moyenne distance au Soleil.

Cette loi s'étend encore aux Planetes secondaires; en observant que dans ce cas les révolutions & les distances se doivent entendre par rapport à la Planete principale, autour de laquelle les autres tournent. Par cette loi, la distance de deux Planetes au Soleil, & le temps de la révolution de l'une étant donnés, on peut trouver le temps de la révolution de l'autre; ou le temps de la révolution

46 F I G U R E

de deux Planetes , & la distance de l'une de ces Planetes au Soleil étant donnés , on peut trouver la distance de l'autre.

Ces deux loix posées , il n'est plus seulement question d'expliquer pourquoi en général les Planetes tournent autour du Soleil , il faut expliquer encore pourquoi elles observent ces loix ; ou du moins il faut que l'explication qu'on donne de leur mouvement ne soit pas démentie par ces loix.

Puisque les distances des Planetes au Soleil , & les temps de leurs révolutions sont différents , la matiere du Tourbillon n'a pas par-tout la même densité , & le temps de sa révolution n'est pas le même par-tout.

De ce que chaque Planete décrit autour du Soleil des aires proportionnelles aux temps, il suit que les vîtesses des couches de la matière du Tourbillon sont réciproquement proportionnelles aux distances de ces couches au centre.

Mais de ce que les temps des révolutions des différentes Planetes sont proportionels aux racines quarrées des cubes de leurs distances au Soleil, il suit que les vîtesses des couches sont réciproquement proportionnelles aux racines quarrées de leurs distances.

Si l'on veut donc affûrer une de ces loix aux Planetes, l'autre devient nécessairement incom-

patible. Si l'on veut que les couches du Tourbillon aient les vitesses nécessaires pour que chaque Planete décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux temps ; il s'enfuivra par exemple , que Saturne devoit employer 90 ans à faire sa révolution , ce qui est fort contraire à l'expérience.

Si au contraire , on veut conserver aux couches du Tourbillon , les vitesses nécessaires , pour que les temps des révolutions soient proportionnels aux racines quarrées des cubes des distances ; l'on verra les aires décrites autour du Soleil par les Planetes , ne plus suivre la proportion des temps.

Je

Je ne parle point ici des objections qu'on a faites contre les Tourbillons , qui ne paroissent pas invincibles. Je ne dis rien de celle que M. Newton avoit faite , en supposant , comme fait M. Descartes , que le Tourbillon reçoive son mouvement du Soleil , qui tournant sur son axe , communiqueroit ce mouvement de couche en couche , jusqu'aux confins du Tourbillon : M. Newton avoit cherché par les loix de la Méchanique , les vîtesses des différentes couches du Tourbillon , & il les trouvoit fort différentes de celles qui sont nécessaires pour la regle de Képler , qui regarde le rapport entre les temps périodiques des

D

Planetes , & leurs distances au Soleil. M. Bernoulli dans la belle Differtation qui remporta le Prix de l'Académie en 1730 , a fait voir que M. Newton n'avoit pas fait attention à quelque circonstance qui change le calcul. Il est vrai qu'en faisant cette attention , on ne trouve pas encore les vîtesses des couches , telles qu'elles devroient être pour l'observation de cette loi ; mais elles en approchent davantage.

Mais enfin de quelque cause que vienne le mouvement du Tourbillon , l'on pourra bien accorder les vîtesses des couches avec une des loix dont nous avons parlé ; mais jamais avec

l'une & l'autre en même-temps. Cependant ces deux loix sont aussi inviolables l'une que l'autre.

Les gens les plus éclairés ont cherché des remedes à cela. M. Leibnitz a été réduit à dire * qu'il falloit que par tout l'Orbe que décrit chaque Planete, il y eût une circulation, qu'il appelle *harmonique*, c'est-à-dire, une certaine loi de vitesse propre à faire suivre aux Planetes celle des deux loix qui regarde la proportion entre les aires & les temps; & qu'il falloit en même temps que par toute l'étendue du Tourbillon, il se trouvât une autre loi différente pour faire

*Voyés *Al. erud.* 1689. p. 82. & 1706. p. 446.

suivre aux Planetes la loi qui regarde la proportion entre leurs temps périodiques & leurs distances au Soleil. Voilà tout ce qu'a pû dire un des plus grands hommes du siècle, pour la défense des Tourbillons.

M. Bulffinger, dans la Dissertation qui remporta le Prix en 1728, reconnoît & démontre encore mieux la nécessité de ces différentes loix dans le fluide qui entraîne les Planetes. Mais il n'est pas facile d'admettre ces différentes couches sphériques se mouvant avec des vîtesses indépendantes & interrompues.

Il y a encore contre ce Systeme une objection qui n'est guère moins forte. Les différen-

tes couches du Tourbillon ont à peu près les mêmes densités que les Planètes qu'elles portent , puisque chaque Planète se soutient dans la couche où elle se trouve ; & ces couches se meuvent avec des vitesses fort rapides. Cependant nous voyons les Comètes traverser ces couches sans recevoir d'altération sensible dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes seroient aussi apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers les fluides qui portent les Planètes , sans se confondre , ni altérer leur cours.

Passons à l'explication de la Pesanteur dans le Systeme des Tourbillons.

Tous les Corps tombent , lorsqu'ils ne sont pas soutenus , & tendent à s'approcher du centre de la Terre.

M. Descartes ; pour expliquer ce phénomène , suppose un Tourbillon d'une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de la Terre dans la direction de l'Equateur. On sçait que lorsqu'un corps décrit un cercle , il tend à s'éloigner du centre ; toutes les parties de ce fluide , ont donc chacune cette force centrifuge , qui tend à les éloigner du centre du cercle qu'elles décrivent. Si donc alors elles rencontrent quelque corps qui n'ait point , ou qui ait moins de cette force centrifuge , il faut

dra qu'il cede à leur effort ; & les parties du fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront successivement sa place , jusqu'à ce qu'elles l'aient chassé au centre.

Cette explication générale de la Pesanteur , se trouve encore exposée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les deux principales , qui sont de M. Huygens.

Ce grand homme objecta ,

1°. Que si le mouvement d'un pareil Tourbillon étoit assez rapide pour chasser les corps vers le centre avec tant de force , il devroit faire éprouver aux mêmes corps quelque impulsion horizontale , ou plutôt entraîner

tout dans le sens de sa direction.

2°. Qu'en attribuant la cause de la pesanteur à un Tourbillon qui se meut parallelement à l'Equateur , les corps ne seroient point chassés vers le centre de la Terre , mais devroient tomber perpendiculairement à l'axe. La chute des corps étant l'effet de la force centrifuge de la matière du Tourbillon , & cette force tendant à éloigner cette matière du centre de chaque cercle qu'elle décrit , elle devroit dans chaque lieu chasser les corps vers le centre de ce cercle ; & les corps , au lieu de tendre vers le centre de la Terre , tomberoient perpendiculairement à l'axe.

Or ni l'un ni l'autre de ces deux effets n'arrive. On remarque par-tout que la chute des corps n'est accompagnée d'aucune déviation; & que les corps tombent perpendiculairement à la surface de la Terre.

C'est le fort du Systeme de M. Descartes , de trouver toujours d'habiles défenseurs. M. Saurin a répondu fort ingénieusement à ces deux difficultés*.

Voyons les remedes que M. Huygens apporte aux inconveniens qu'il trouve dans le Systeme de M. Descartes. Au lieu

* Voyés le second Journal des Sçav. 1703. & les Mem. de l'Acad. 1709. page 131. & ce qui a été dit depuis. Comment. Acad. Scient. Imp. Petrop. tom. 1. page 245. & tome 2. page 318.

de faire mouvoir la matière éthérée toute ensemble autour des mêmes Poles, il suppose qu'elle se meut en tout sens dans l'espace sphérique qui la contient. Ces mouvements se contrariant les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils soient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à se mouvoir dans des surfaces sphériques dans toutes les directions.

Cette hypothèse une fois posée, délivre le Tourbillon des deux objections qu'on lui faisoit.

1°. La matière éthérée qui cause la pesanteur, circulant dans toutes les directions, elle ne doit pas entraîner les

corps horizontalement comme le Tourbillon de M. Descartes ; parce que l'impulsion horizontale qu'ils reçoivent de chaque filet de cette matière , est détruite par une impulsion opposée.

2°. L'on voit que les corps doivent tomber vers le centre de la Terre ; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque superficie sphérique , les chassant vers l'axe de cette superficie , ils doivent tomber vers l'intersection de tous ces axes , qui est le centre de la Terre.

Ce Systeme satisfait mieux aux phénomènes de la pesanteur , que ne fait celui de M. Descartes ; mais il faut avouer aussi qu'il

est bien éloigné de sa simplicité. Il n'est pas facile de concevoir ces mouvements circulaires de la matière éthérée dans toutes les directions ; & ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l'impulsion de la matière éthérée , n'ont pas été contents de ce que M. Huygens a fait pour la soutenir.

M. Bulffinger ne pouvant admettre ce mouvement en tout sens , a proposé un troisième Système.

Il prétend que la matière éthérée se meut en même-temps autour de deux axes perpendiculaires l'un à l'autre ; mais quoiqu'un pareil mouvement soit déjà assez difficile à supposer , il

DES ASTRES. 61

suppose encore deux nouveaux mouvements dans la matière éthérée, opposés aux deux premiers. Voilà donc quatre Tourbillons opposés deux à deux, qui se traversent sans se détruire.

C'est ainsi que dans le Systeme des Tourbillons, on rend raison des deux principaux Phénomènes de la Nature.

Qu'une matière fluide qui circule, entraîne les Planetes autour du Soleil. Que dans le Tourbillon particulier de chaque Planete, un pareil mouvement de matière chasse les corps vers le centre. Ce sont-là des idées qui se présentent assez naturellement à l'Esprit.

Mais la nature mieux exami-

née, ne permet pas de s'en tenir à ces premières vûes. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail, sont obligés d'admettre dans le Tourbillon solaire, l'interruption des mouvements des différentes couches dont nous avons parlé; & dans le Tourbillon terrestre, tous ces différents mouvements opposés les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n'est qu'à ces fâcheuses conditions, qu'on peut expliquer les phénomènes par le moyen des Tourbillons.

Ces embarras ont fait dire à l'Auteur * que nous avons déjà cité plusieurs fois, que malgré tout ce qu'il faisoit pour défen-

* M. Bulffinger.

dre les Tourbillons, ceux qui refusent de les admettre, s'affermiroient peut-être dans leur refus par la matière dont il les défendoit.

Il faut avouer que jusqu'ici l'on n'a pû encore accorder, d'une manière satisfaisante, les Tourbillons avec les Phénomènes. Cependant l'on n'est pas pour cela en droit d'en conclure l'impossibilité. Rien n'est plus beau que l'idée de M. Descartes, qui vouloit que l'on expliquât tout en Physique par la matière & le mouvement; mais si l'on veut conserver à cette idée sa beauté, il ne faut pas se permettre d'aller supposer des matières & des mouvements,

sans autre raison que le besoin qu'on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raison du mouvement des Planetes, & de la Pesanteur.

C H A P I T R E I V.

Système de l'Attraction pour expliquer les mêmes Phénomènes.

MNEWTON commence par démontrer , que si un corps qui se meut est attiré vers un centre immobile, ou mobile, il décrira autour de ce centre des aires proportionnelles aux temps; & réciproquement, que si un corps décrit autour d'un

d'un centre immobile , ou mobile , des aires proportionnelles aux temps , il est attiré vers ce centre.

Ceci démontré par les raisonnemens de la plus sûre Géométrie , il l'applique aux Planetes qu'il considère se mouvoir dans le vuide , ou dans des espaces si peu remplis de matière , qu'elle n'apporte aucune résistance sensible aux corps qui s'y meuvent. Les Observations apprenant que toutes les Planetes du premier ordre autour du Soleil , & tous les Satellites autour de leur Planete principale , décrivent des aires proportionnelles aux temps ; il conclut que les Planetes sont attirées vers le Soleil,

E

& les Satellites vers leur Planete.

Quelle que soit la loi de cette force qui attire les Planetes , c'est-à-dire , de quelque manière qu'elle croisse ou diminue , selon la distance où sont les Planetes, il suffit en général qu'elles soient attirées vers un centre, pour que les aires qu'elles décrivent autour , suivent la proportion des temps. L'on ne connoît donc point encore par cette proportion observée , la loi de la force centrale.

Mais si l'une des analogies de Képler , (c'est ainsi qu'on appelle cette proportionnalité des aires & des temps) a fait découvrir une force centrale en gé-

néral, l'autre analogie fait connoître la loi de cette force.

Cette autre analogie, comme nous avons vû ci-dessus, consiste dans le rapport entre les temps des révolutions des différentes Planetes & leurs distances. Les temps des révolutions des différentes Planetes autour du Soleil, & des Satellites autour de leur Planete, sont proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs distances au Soleil, ou à la Planete principale.

Or cette proportion entre les temps des révolutions, & les distances des Planetes, une fois connue, M. Newton cherche quelle doit être la loi, selon laquelle la force centrale croît ou

diminue , pour que des corps qui se meuvent par une même force dans des Orbites circulaires , ou dans des Orbites fort approchantes , comme font les Planetes , observent cette proportion entre leurs distances & leurs temps périodiques ; & la Géométrie démontre facilement que cette autre analogie suppose que la force qui attire les Planetes & les Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes qu'elles décrivent , est réciproquement proportionnelle au quarré de leur distance à ce centre , c'est-à-dire , qu'elle diminue en même proportion que le quarré de la distance augmente.

Ces deux analogies si difficiles à concilier dans le Systeme des Tourbillons, ne servent ici que de faits qui découvrent, & la force centrale, & la loi de cette force.

Supposer cette force & sa loi, n'est plus faire un Systeme ; c'est découvrir le principe dont les faits observés sont les conséquences nécessaires. On n'établit point la pesanteur vers le Soleil, pour expliquer le cours des Planètes ; le cours des Planètes nous apprend qu'il y a une pesanteur vers le Soleil, & quelle est sa loi. Voyons maintenant quel usage M. Newton va faire du principe qu'il vient de découvrir.

Aidé de la plus sublime Géométrie , il va chercher la courbe que doit décrire un corps , qui avec un mouvement rectiligne d'abord , est attiré vers un centre par une force dont la loi est celle qu'il a découverte.

La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps décrira nécessairement quelque une des Sections coniques ; & que si la route que trace ce corps , rentre en elle-même , comme il arrive aux Orbites des Planetes , cette courbe sera une Ellipse , dans le foyer de laquelle résidera la force centrale.

Si M. Newton a dû aux deux premières analogies , la décou-

verte de l'attraction & de sa loi, il en voit ici la confirmation par de nouveaux phénomènes. Toutes les observations font voir que les Planètes se meuvent dans des Ellipses, dont le Soleil occupe le foyer.

Les Comètes si embarrassantes dans le Système des Tourbillons, donnent une nouvelle confirmation du Système de M. Newton.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui se meuvent autour du Soleil, tendent vers lui, suivant une certaine loi, & doivent se mouvoir dans quelque Section conique, comme il arrive en effet aux Planètes, dont les Orbites sont des Ellipses,

Eiii]

confidère les Cometes comme des Planetes qui se meuvent par la même loi, dont les Orbites sont des Ellipfes, mais si allongées, qu'on les peut prendre, sans erreur sensible, pour des paraboles.

Il ne s'en tient pas à cette considération, qui déjà prévient assez en sa faveur, il lui faut quelque chose de plus exact. Il faut voir si l'Orbite d'une Comete, déterminée par quelques points donnés dans les premières Observations, & par l'attraction vers le Soleil, quadrera avec la trace que la Comete décrit réellement dans le reste de son cours. Il a calculé ainsi, lui & le sçavant Astronome M. Halley, les

Orbites des Cometes , dont les Observations nous ont mis en état de faire cette comparaison; & l'on ne sçauroit voir sans admiration , que les Cometes se sont trouvées aux points de leurs Orbites ainsi déterminées, presque avec autant d'exactitude, que les Planetes se trouvent aux lieux de leurs Orbites déterminés par les Tables ordinaires.

Il ne paroît plus manquer à cette Théorie qu'une suite assez longue d'Observations, pour nous mettre en état de reconnoître chaque Comete , & de pouvoir annoncer son retour , comme nous faisons le retour des Planetes aux mêmes points du Ciel. Mais des Astres, dont

les révolutions , selon toutes les apparences , durent plusieurs siècles , ne paroissent guères faits pour être observés par des hommes dont la vie est si courte.

Voilà , quant au cours des Planetes & des Cometes , tous les Phénomènes expliqués par un seul principe. Les Phénomènes de la pesanteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce principe ?

Les corps tombent vers le centre de la Terre ; c'est l'attraction que la Terre exerce sur eux qui les y fait tomber. Cette explication est trop vague.

Si la quantité de la force attractive de la Terre étoit connue par quelque autre phéno-

DES ASTRES. 75

mene que celui de la chute des corps, l'on pourroit voir si la chute des corps, circonftanciée comme on fçait qu'elle l'eft, eft l'effet de cette même force.

Nous avons vû que comme l'attraction que le Soleil exerce fur les Planetes, fait mouvoir les Planetes autour de lui, de même l'attraction que les Planetes qui ont des Satellites exercent fur eux, les fait mouvoir autour d'elles; la Lune eft Satellite de la Terre, c'eft donc l'attraction de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d'elle.

L'Orbite de la Lune & le temps de fa révolution autour de la Terre font connus; on peut par-là connoître l'efpace

que la force qui attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un temps donné, si la Lune venant à perdre son mouvement, tomboit vers la Terre en ligne droite avec cette force.

La moyenne distance de la Lune à la Terre étant d'environ 60 demi-diamètres de la Terre, l'on trouve par un calcul facile, que l'attraction que la Terre exerce sur la Lune, dans la région où elle est, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.

Mais l'attraction croissant dans le même rapport que le quarré de la distance diminue; si la Lune ou quelque autre corps, se trouvoient placés près de la

superficie de la Terre, c'est-à-dire, 60 fois plus près de la Terre que n'est la Lune, l'attraction de la Terre feroit 3600 fois plus grande; & elle feroit parcourir au corps qu'elle attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que les corps, dans le commencement de leur mouvement, parcourent des espaces proportionnels aux forces qui les font mouvoir.

Or, on sçait par les expériences de M. Huygens, l'espace que parcourt un corps animé par la seule pesanteur, vers la surface de la Terre; & cet espace se trouve précisément celui que doit faire parcourir la force qui

retient la Lune dans son Orbite, augmentée comme elle doit être vers la surface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre est donc un effet de cette même force ; d'où l'on voit que la pesanteur des corps , plus éloignés du centre de la Terre , est moindre que la pesanteur de ceux qui sont plus proches : quoique les plus grandes distances , où nous puissions faire des expériences , soient trop peu considérables pour nous rendre sensible cette différence de pesanteur.

Des expériences particulières ont appris , qu'à la même distance du centre de la Terre , les poids des différents corps, qui ré-

sultent de cette attraction , sont proportionnels à leurs quantités de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre agit donc proportionnellement sur toutes les parties de la matière.

Or l'attraction doit être mutuelle ; un corps ne sçauroit en attirer un autre , qu'il ne soit attiré également vers cet autre. Si l'attraction que la Terre exerce sur chaque partie de la matière est égale , chaque partie de la matière a aussi une attraction égale qu'elle exerce à son tour sur la Terre ; & un Atome ne tombe point vers la Terre , que la Terre ne s'élève un peu vers lui.

C'est ainsi que le cours des

Planetes & toutes ses circonstances s'expliquent par le principe de l'attraction, mais encore la pesanteur des corps n'est qu'une suite du même principe.

Je ne parle point ici d'irrégularités si peu considérables, qu'on les peut négliger sans erreur, ou expliquer par le principe.

On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer des Ellipses que décrivent les Planetes; cependant il n'est point absolument immobile, l'attraction entre deux corps étant toujours mutuelle, le Soleil ne sçauroit attirer les Planetes qu'il n'en soit attiré. Si l'on parle donc à la rigueur, le Soleil

leil change continuellement de place selon les différentes situations des Planetes. Ce n'est donc proprement que le centre de gravité du Soleil & de toutes les Planetes qui est immobile ; mais l'énormité du Soleil par rapport aux Planetes , est telle , que quand elles se trouveroient toutes du même côté , la distance du centre du Soleil au centre commun de gravité , qui est alors la plus grande qu'elle puisse être , ne seroit que d'un seul de ses diametres.

Il faut entendre la même chose de chaque Planete qui a des Satellites. La Lune , par exemple , attire tellement la Terre , que ce n'est plus le centre de la

82 F I G U R E

Terre qui décrit une Ellipse au foyer de laquelle est le Soleil , mais cette Ellipse est décrite par le centre commun de gravité de la Terre & de la Lune , tandis que chacune de ces Planetes tourne autour de ce centre de gravité, dans l'espace d'un mois.

L'attraction mutuelle des autres Planetes n'apporte pas à leur cours de changements sensibles; Mercure, Venus, la Terre & Mars n'ont pas assez de grosseur pour que leur action des unes sur les autres trouble sensiblement leur mouvement. Ce mouvement ne sçauroit être troublé que par Jupiter & Saturne, ou quelques Cometes qui pourroient causer quelque mou-

vement dans les Aphélies de ces Planetes , mais si lent qu'on le néglige entièrement.

Il n'en est pas de même de l'attraction qui s'exerce entre Jupiter & Saturne ; ces deux puissantes Planetes dérangent leur mouvement réciproquement , lorsqu'elles sont en conjonction ; & ce dérangement est assez considérable pour avoir été observé par les Astronomes.

C'est ainsi que l'attraction & sa loi ayant été une fois établies par le rapport entre les Aires que les Planetes décrivent autour du Soleil & les temps , & par le rapport entre les temps périodiques des Planetes & leurs distances ; les autres Phénomè-

nes ne sont plus que des suites nécessaires de cette attraction. Les Planetes doivent décrire les courbes qu'elles décrivent ; les corps doivent tomber vers le centre de la Terre, & leur chute doit avoir la rapidité qu'elle a ; enfin les mouvements des Planetes reçoivent jusqu'aux dérangements qui doivent résulter de cette attraction.

Un des effets de l'attraction, qui est la chute des corps, se fait assez appercevoir ; mais cet effet même est ce qui nous empêche de découvrir l'attraction que les corps exercent entre eux. La force de l'attraction étant proportionnelle à la quantité de matière des corps, l'at-

traction de la Terre sur les corps particuliers nous empêché continuellement de voir les effets de leur attraction propre ; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force immense, cette force rend insensibles leurs attractions particulières, comme la tempête rend insensible le plus léger souffle *.

* Cependant cette Attraction ne seroit pas tout-à-fait insensible, pourvu qu'on la recherchât dans des corps dont les Masses eussent quelque proportion avec la Masse entière de la Terre. Mrs. Bouguer & de la Condamine envoyés par le Roi au Perou, ont trouvé qu'une très-grosse Montagne appelée *Chimborazo*, située fort près de l'Equateur, attiroit à elle le plomb qui pend au fil des Quart-de-Cercles. Et par plusieurs Observations des hauteurs des Etoiles prises au Nord & au Sud de la Montagne, ils ont trouvé que cette Attraction écartoit le fil à plomb de la Verticale d'un angle de 7" ou 8".

Mais si l'on porte la vûe sur les corps qui peuvent manifester leur attraction les uns sur les autres , on verra les effets de l'attraction aussi continuellement répétés que ceux de l'impulsion. A tout instant les mouvements des Planetes la déclarent , pendant que l'impulsion est un principe que la Nature semble n'employer qu'en petit.

L'attraction n'étant pas moins possible dans la nature des choses , que l'impulsion ; les Phénomènes qui indiquent l'attraction étant aussi fréquents que ceux qui prouvent l'impulsion ; lorsqu'on voit un corps tendre vers un autre , dire que ce n'est point qu'il soit attiré , mais qu'il y a

quelque matière invisible qui le pousse , c'est à peu-près raisonner comme feroit un partisan de l'attraction , qui voyant un corps poussé par un autre , se mouvoir , diroit que ce n'est point par l'effet de l'impulsion qu'il se meut , mais parce que quelque corps invisible l'attire.

C'est maintenant au Lecteur à examiner si l'attraction est suffisamment prouvée par les faits , ou si elle n'est qu'une fiction gratuite dont on peut se passer.



CHAPITRE V.

*Des différentes loix de la Pesanteur,
& des figures qu'elles peuvent
donner aux Corps célestes.*

JE reviens à examiner plus particulièrement la Pesanteur dont les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, déterminent les figures des Corps célestes.

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il faut que toutes leurs parties soient dans un équilibre parfait. Or ces parties sont animées par deux forces, desquelles doit dépendre cet équilibre ; l'une, qui

est la force centrifuge qu'elles acquierrent par leur révolution, tend à les écarter du centre; l'autre qui est la Pesanteur, tend à les en approcher. Sur la force centrifuge, il ne peut y avoir de dispute: elle n'est que cet effort, que les corps qui circulent, font pour s'écarter du centre de leur circulation: & elle vient de la force qu'ont les corps pour persévérer dans l'état où ils sont une fois, de repos ou de mouvement. Un corps forcé de se mouvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel pour s'échapper par la tangente de cette courbe; parce que dans chaque instant, son état est de se mouvoir dans les petites droites

qui composent la courbe , & dont les prolongemens sont les tangentes. La nature de la force centrifuge , & ses effets sont donc bien connus.

Il n'en est pas ainsi de la Pesanteur; les Philosophes se sont fait différens systêmes sur la Nature de cette force ; mais sans nous arrêter à parcourir les différentes loix de Pesanteur qu'on pourroit imaginer , ni même toutes celles qui sont comprises dans les formules des Problêmes qu'on trouvera à la fin de cet Ouvrage , il me semble qu'on peut réduire dans notre *système solaire* les idées les plus vraisemblables à trois différentes loix de pesanteur.

1°. Si l'on jugeoit de la loi de la pesanteur par ce qui se passe seulement autour de la Terre. La Terre étant à peu-près sphérique, & les corps tombant par tout par des lignes perpendiculaires à sa surface, la pesanteur tend par-tout au centre de la Terre, ou à peu-près au centre.

Les symptômes que les corps qui tombent, éprouvent dans leur chute, les vîtesses qu'ils acquièrent, & les espaces qu'ils parcourent, font voir qu'ils tombent comme s'ils étoient accélérés par une force uniforme & toujours la même.

A juger donc de la pesanteur par ces premières vûes, on pourroit croire que c'est une force

constante dirigée vers le centre de la Planete que nous habitons ; & l'on pourroit penser qu'il y a de telles forces vers les centres des autres corps célestes. C'est cette loi d'une pesanteur constante que M. Huygens a supposée dans ses Recherches sur la figure de la Terre.

2°. On peut ne pas s'en tenir à juger de la pesanteur par les symptomes des corps qui tombent : comme on ne peut faire d'expériences sur ces corps, qu'à de petites distances de la surface de la Terre , on peut douter si les symptomes feroient les mêmes à des distances plus grandes. La force qui fait tomber les corps , pourroit être dif-

férente à différentes distances de la surface de la Terre, sans que ces différences nous fussent sensibles dans le peu d'étendue où se font nos expériences.

On a donc poussé la vûe plus loin; on a cherché si la force qui fait tomber les corps vers le centre de la Terre, ne pourroit pas être celle qui retient la Lune dans son Orbite, & qui l'empêche de s'en écarter, comme sûrement elle tend à faire, puisqu'elle décrit une courbe autour de la Terre. Comparant ces deux forces, on a vû que celle qui fait tomber les corps vers le centre de la Terre, étoit la même qui retient la Lune dans son Orbite, diminuée en

raison du quarré de la distance de la Lune à la Terre.

Si donc on juge de la pesanteur par ces deux phénomènes, par celui de la chute des corps vers le centre de la Terre, & par la *Détention* de la Lune dans son Orbite, on la regardera comme une force dirigée vers le centre de la Terre, qui suit la proportion renversée du quarré des distances à ce centre.

Nous ne pouvons expérimenter comment tomberoient les corps vers la surface des autres Planetes; mais nous pouvons déterminer la loi de leur pesanteur par le mouvement des Satellites de celles qui en ont: & ces mouvements nous font voir

une même loi de pesanteur vers chacune de ces Planetes , que celle que nous avons trouvée vers la Terre. Enfin les mouvements de toutes les Planetes autour du Soleil , donnent encore cette même loi de pesanteur vers le Soleil.

On peut donc par toutes ces considérations penser que la pesanteur se fait vers les centres du Soleil , des Planetes , & des autres corps célestes , suivant la proportion renversée du carré des distances à ces centres.

3°. Enfin on peut regarder la pesanteur comme l'effet d'une force répandue dans la matière, par laquelle toutes ses parties s'attirent. Le concours de tou-

tes les forces de la matière qui compose la Terre , attire & fait tomber les corps vers sa surface , retient la Lune dans son Orbite , & produit vers les autres Planetes & vers le Soleil des Phénomènes semblables , toujours à proportion de la quantité de ces forces , de leur direction , & de leur distance.

C'est ainsi que M. Newton a considéré la Pesanteur , il a découvert que cette force répandue dans chaque particule de matière , agissoit en raison directe de la masse où elle réside , & en raison renversée du quarré de sa distance : il en a calculé les effets & déduit tous les Phénomènes.

Quant

Quant à la première idée de cette force , plusieurs Philosophes l'avoient eue avant lui. Sans parler des Anciens , sans parler de Képler qui en avoit senti le besoin pour expliquer les mouvements des Planetes, deux Hommes illustres du siècle passé avoient de l'attraction une idée fort semblable à celle qu'en a donnée M. Newton ; voici comme ils en parlent *.

La commune opinion est que la pesanteur est une qualité qui réside dans le corps même qui tombe.

D'autres sont d'avis que la descente des Corps procède de l'attrac-

* Fermat, var. oper. Mathem. pag. 124.

Lettre de M. de Pascal & de Roberval à M. de Fermat.

tion d'un autre Corps qui attire celui qui descend , comme la Terre.

Il y a une troisième opinion qui n'est pas hors de vraisemblance ; que c'est une attraction mutuelle entre les Corps , causée par un désir naturel que les Corps ont de s'unir ensemble ; comme il est évident au Fer & à l'Aimant , lesquels sont tels que si l'Aimant est arrêté , le Fer ne l'étant pas l'ira trouver ; & si le Fer est arrêté , l'Aimant ira vers lui , & si tous deux sont libres , ils s'approcheront réciproquement l'un de l'autre , en sorte toutes fois que le plus fort des deux fera le moins de chemin , &c.

Ceux que le mot d'*Attraction* blesse , & qui reprochent à M. Newton d'avoir ramené dans la Philosophie les qualités occultes,

verront que le terme dont on se fert ici de *Désir naturel*, est plus dur que tout ce que M. Newton a jamais dit sur cette matière.

Voilà quelles sont les idées qu'on peut avoir sur la Pesanteur, par les phénomènes qu'on observe dans notre *Système solaire*. Ils font tous voir qu'il y a autour des corps célestes une force qui fait tomber les corps vers quelque centre qui se trouve dans ces corps ; soit que cette force soit le résultat d'autres forces répandues dans toutes les parties de la matière, soit qu'elle tende elle-même vers des points centraux.

Mais autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes,

& autour des Planetes que vraisemblablement elles ont , les mêmes Phénomènes auroient-ils lieu ? & les mêmes loix de pesanteur s'observeroient-elles ? Rien ne peut nous en assurer , & nous n'en pouvons juger que par une espèce d'induction.

Toutes les loix précédentes de pesanteur donnent aux Astres qui ont une révolution autour de leur axe , les figures de sphéroïdes aplatis : & quoique les Planetes que nous connoissons dans notre *Système solaire* approchent de la sphéricité , elles n'en étoient pas moins sujettes à des figures fort applaties. Il ne falloit pour cela qu'une pesanteur moins grande ou une révo-

lution plus rapide autour de leur axe. Et pourquoi l'espèce d'uniformité que nous voyons dans un petit nombre de Planetes nous empêcheroit-elle de soupçonner du moins la variété des autres que nous cache l'immensité des Cieux? Rélégués dans un coin de l'Univers avec de foibles organes, pourquoi bornerions-nous les choses au peu que nous en appercevons?

Quoique plusieurs des loix de pesanteur qui sont comprises dans les formules des Problèmes qu'on trouvera à la fin de cet Ouvrage, ne permettent aux Planetes & aux Soleils, que des aplatissements limités, une infinité de ces loix donneroient

aux Astres des figures plus variées , des applatissements sans bornes , & pourroient les réduire à n'être que des Plans circulaires.

CHAPITRE VI.

Taches lumineuses découvertes dans le Ciel.

DANS ces derniers temps , non seulement on a découvert que quelques Planetes de notre *Système solaire*, n'étoient pas des Globes parfaits : on a porté la vûe jusques dans le Ciel des Etoiles fixes, & par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans ces Régions éloignées des Phénomènes qui semblent

annoncer une aussi grande variété dans ce genre , qu'on en voit dans tout le reste de la nature.

Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolution autour d'un centre, doivent, selon une infinité de loix de pesanteur , former des Astres fort aplatis & en forme de Meules , qu'on rangera dans la classe des Soleils, ou des Planètes, selon que la matière qui les forme sera lumineuse par elle-même , ou opaque & capable de réfléchir la lumière. Soit que la matière de ces Meules soit par-tout de même nature, soit que pesant vers quelque Astre d'une nature différente , elle

l'inonde de toutes parts , & forme autour un sphéroïde applati qui renferme l'Astre.

De célèbres Astronomes s'étant appliqués à observer ces Apparences célestes qu'on appelle *Nébuluses* , & qu'on attribuoit autrefois à la lumière confondue de plusieurs petites Etoiles fort proches les unes des autres , & s'étant servis de Lunetes plus fortes que les Lunetes ordinaires , ont découvert , que du moins plusieurs de ces Apparences , non - seulement n'étoient point causées par ces amas d'Etoiles qu'on avoit imaginés , mais même n'en renfermoient aucune ; & ne paroïssent être que de grandes Aires

ovales , lumineuses , ou d'une lumiere plus claire que le reste du Ciel.

M. Huygens fut le premier qui découvrit dans la Constellation d'*Orion* une Tache de figure irréguliere , & d'une teinte différente de tout le reste du Ciel , dans laquelle ou à travers laquelle il apperçut quelques petites Etoiles *.

M. Halley parle de 6. de ces Taches , dont la 1^{re} est dans l'*Epee d'Orion* , la 2^e. dans le *Sagittaire* , la 3^e. dans le *Centaure* , la 4^e. précède le pied droit d'*Antinoïs* , la 5^e. dans *Hercule* , & la 6^e. dans la *Ceinture d'Andromede* **.

* *Hug. Syst. Saturn.*

** *Transactions Philosophiques* , Num. 347.

Cinq de ces Taches ayant été observées avec un Télescope de réflexion de 8. pieds , il ne s'en est trouvé qu'une , celle qui précède le pied d'*Antinoüs* qui puisse être prise pour un amas d'Etoiles.

Les 4. autres paroissent de grandes Aires blanchâtres , & ne diffèrent entr'elles , qu'en ce que les unes sont plus rondes , & les autres plus ovales. Dans celle d'*Orion* les petites Etoiles qu'on découvre avec le Télescope ne paroissent pas capables de causer sa blancheur *.

M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes qu'il croit propres à éclaircir une chose

* *Transaëlions Philosophiques* , Num. 428.

qui paroît difficile à entendre dans le livre de *la Genèse*; qui est que la lumiere fut créée avant le Soleil. Enfin il recommande ces merveilleux Phénomènes aux spéculations des Naturalistes & des Astronomes.

M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des Trous à travers lesquels on découvre une région immense de lumiere, & enfin *le Ciel Empyrée*.

Il prétend avoir pû distinguer que les Etoiles qu'on aperçoit dans quelques-unes sont beaucoup moins éloignées de nous que ces Taches. Mais c'est ce que l'Optique nous apprend, qu'on ne sçauroit décider. Passé un certain éloignement, qui

même n'est pas fort considérable , il n'est pas possible de déterminer lequel est le plus éloigné de deux objets qui n'ont ni l'un ni l'autre de parallaxe ; & dont les degrés de lumière sont inconnus.

Quoique vraisemblablement il y ait de ces Taches répandues en grand nombre par-tout le Ciel , on sera peut-être bien-aïse de trouver ici les lieux des principales, qu'on a jusqu'ici découvertes. Les voici d'après Hévélius,

<i>Lieux des Né- buleuses.</i>	<i>Leur Ascen- sion droite pour l'an 1660.</i>	<i>Leur Déclinaï- son pour l'an 1660.</i>
	D. M. S.	D. M. S.
Dans la ceinture d'An- dromede.	6. 4. 45.	39. 27. 57. N.
Dans le front du Capri- corne.	300. 2. 53.	20. 1. 53. S.
Une autre précédant l'œil du Capricorne.	301. 59. 55.	19. 11. 30. S.
Une autre qui le suit. . . .	302. 35. 9.	19. 36. 0. S.
Une au-dessus de celles- là, qui joint l'œil du Capri- corne.	302. 25. 31.	18. 48. 58. S.
Celle qui précède au-des- sus de la Queue du Cigne, & la dernière de son Pied	304. 54. 8.	47. 54. 20. N.
Une qui est après une E- toile au-dessus de la Queue du Cigne, hors de la Con- stellation.	312. 10. 5.	53. 5. 20. N.
Au dehors du Pied gau- che d'Hercule.	264. 52. 46.	48. 9. 10. N.
Dans la jambe gauche d'Hercule.	265. 38. 37.	38. 5. 50. N.
Sur le sommet de la Tête d'Hercule.	252. 24. 3.	13. 18. 37. N.
A l'Oreille de Pégase. . . .	332. 38. 45.	3. 3. 12. N.
Au bord Occidental du Bouclier de Sobieski. . . .	272. 32. 34.	14. 23. 35. S.
Sur le fleau de la Balance. .	219. 26. 15.	9. 16. 27. S.
Au dessus du Dos de la Grande Ourse	183. 32. 41.	60. 20. 33. N.
Sur la troisième jointure de la Queue du Scorpion...	12. 43. 00.	19. 1. 0.
Entre la Queue du Scor- pion, & l'Arc du Sagittaire.	24. 32. 00.	11. 25. 0.
	→ long.	S. lat.
	→ long.	S. lat.

Tous ces Phénomènes se trouvent par notre Systême si naturellement & si facilement expliqués, qu'il n'est presque pas besoin d'en faire l'application.

Nous avons vû qu'il peut y avoir dans les Cieux des masses de matiere soit lumineuse, soit réfléchissant la lumiere, dont les formes font des sphéroïdes de toute espèce, les uns approchans de la sphéricité, les autres fort aplatis. De tels Astres doivent causer des apparences semblables à celles dont nous venons de parler.

Ceux qui approchent de la sphéricité seront vûs comme des Taches circulaires, quelqu'angle que fasse l'axe de leur révo-

DES ASTRES. III

lution avec le plan de l'Ecliptique ; les autres , dont la figure est aplatie , doivent paroître des Taches circulaires ou ovales , selon la maniere dont le Plan de leur Equateur se présente à l'Ecliptique.

Enfin ces Astres aplatis doivent nous présenter des figures irrégulieres ; si plusieurs , diversement inclinés & placés à différentes distances , ont quelques-unes de leurs parties cachées pour nous par les parties des autres.

Quant à la matière dont ils sont formés ; il n'est guere permis de prononcer si elle est aussi lumineuse que celle des Etoiles , & si elle ne brille moins

que parce qu'elle est plus éloignée.

S'ils sont formés d'une matiere aussi lumineuse que les Etoiles, il faut que leur grosseur soit énorme par rapport à la leur, pour que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand, que fait voir la diminution de leur lumiere, on les voye au Telescope avec grandeur & figure.

Et si on les suppose d'une grosseur égale à celle des Etoiles; il faut que la matiere qui les forme soit moins lumineuse, & qu'elles soient infiniment plus proches de nous, pour que nous les puissions voir avec une grandeur sensible.

On prétend cependant que
ces

ces Taches n'ont aucune paralaxe : & c'est un fait qui mérite d'être observé avec soin ; car peut-être que ce n'est que par un trop petit nombre d'Astres observés qu'on a désespéré de la paralaxe des autres.

On ne peut jusqu'ici s'assurer si les Astres qui forment ces Taches , sont plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. S'ils le sont plus ; les Etoiles qu'on découvre dans la Tache d'*Orion* , & qu'on découvreroit vraisemblablement dans plusieurs autres , sont vûes projetées sur le Disque de nos Astres dont la lumière plus foible que celle de l'Etoile ne peut la ternir : s'ils le sont moins ; la matière qui les

H

forme , n'empêche pas que nous voyons les Etoiles à travers , comme on les voit à travers les queues des Cometes.

C H A P I T R E V I I .

Des Etoiles qui s'allument ou qui s'éteignent dans les Cieux ; & de celles qui changent de grandeur.

LA différence entre l'axe de notre Soleil & le diamètre de son Equateur , n'est presque rien : la pesanteur immense vers ce grand corps , & la lenteur de sa révolution autour de son axe , ne lui permettent qu'un applatissement insensible. D'autres Soleils pourroient être applatis à l'infini.

DES ASTRES. 115

Toutes ces figures s'accordent aussi-bien avec les loix de la Statique, que celle d'un sphéroïde plus approchant de la sphère ; il n'y a que la sphéricité parfaite qui ne s'y accorde pas , dès qu'ils tournent autour de leur axe.

On ne connoît jusqu'ici la figure des Etoiles fixes par aucune observation : nous ne les voyons que comme des points lumineux , dont l'éloignement nous empêche de discerner les parties. On peut raisonnablement penser que dans leur multitude il se trouve des figures de toute espece.

Cela posé, il est facile d'expliquer comment quelques Etoiles ont disparu dans les Cieux ,

H ij

comment d'autres ont semblé s'allumer , ont duré quelque temps , ensuite ont cessé de luire & ont paru s'éteindre.

Tout le monde sçait la disparition d'une des *Pléiades*. On observa en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paroître dans la *Cassiopée* , qui l'emportoit en lumiere sur toutes les Etoiles du Ciel, & qui, après avoir duré plus d'un an , disparut. On en avoit vu une dans la même Constellation en 945. sous l'empire d'*Othon* ; il est fait mention d'une qui parut encore vers la même Région du Ciel en 1264. & ces trois pourroient assez vraisemblablement n'être que la même.

On observe aussi dans quel-

ques Constellations , des Etoiles dont la lumiere paroît croître & diminuer alternativement; il s'en trouve une dans le *Col de la Baleine* , qui semble avoir des périodes réglées d'augmentation & de diminution , & qui depuis plusieurs années étonne les Observateurs. Le Ciel & les temps sont remplis de ces phénomènes *.

Je dis maintenant que si parmi les Etoiles , il s'en trouve d'une figure fort aplatie ; elles nous paroîtront comme feroient des Etoiles sphériques , dont le diamètre feroit le même que celui de leur Equateur , lorsqu'el-

* Voyez l'Histoire de ces Etoiles dans les Elem. d'Astron. de M. Cassini.

les nous présenteront leur face ; mais si elles viennent à changer de situation , par rapport à nous , si elles nous présentent leur tranchant , nous verrons leur lumière diminuer plus ou moins , selon la différente manière dont elles se présenteront ; & nous les verrons tout-à-fait s'éteindre , si leur applatissement & leur distance sont assez considérables.

De même des Etoiles que leur situation nous avoit empêché d'appercevoir , paroîtront , lorsqu'elles prendront une situation nouvelle ; & ces alternatives ne dépendront que du changement de situation de ces Astres par rapport à nous.

Il ne faut plus qu'expliquer comment il peut arriver du changement dans la situation de ces Etoiles applaties.

Tous les Philosophes d'aujourd'hui regardent chaque Etoile fixe , comme un Soleil à peu près semblable au nôtre , qui a vraisemblablement ses Planetes & ses Cometes , c'est-à-dire , qui a autour de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.

Quelqu'une de ces Planetes qui circulent autour d'un Soleil applati , peut avoir une telle excentricité , & se trouver si près de son Soleil dans son Périhélie , qu'elle dérangera sa situation , soit par la pesanteur que cha-

H iiii

que Planete porte , pour ainsi dire avec elle, selon le systême de M. Newton, qui fait que dès qu'elle passe auprès de son Soleil , la pesanteur de son Soleil vers elle , & la pesanteur d'elle vers lui , ont un effet sensible ; soit par la pression qu'une telle Planete causeroit alors au fluide qui se trouveroit resserré entre elle & son Soleil , si l'on vouloit encore admettre des Tourbillons.

De quelque cause que vienne la pesanteur ; tout conduit à croire qu'il y a autour de chaque Planete & de chaque corps céleste une force qui feroit tomber les corps vers eux , comme celle que nous éprouvons sur

notre Terre. Une pareille force suffit pour changer la situation d'un Soleil, lorsqu'une Planete passe fort proche de lui; & cette situation changera selon la maniere dont le plan de l'Orbite de la Planete coupera le plan de l'Equateur du Soleil.

Le passage des Planetes dans leur Périhélie auprès des Soleils aplatis, doit non-seulement leur faire présenter des faces différentes de celles qu'ils présentent; il peut encore changer la situation de leur centre, & les déplacer entièrement. Mais on voit assez que quand le centre de ces Soleils seroit avancé ou reculé de la distance d'un ou de plusieurs de leurs diamètres,

ce changement ne pourroit pas nous être sensible pour des Etoiles dont le diametre ne nous l'est pas. Ainsi quand on auroit observé avec exactitude que le lieu de ces Etoiles sujettes au changement a toujours été le même dans le Ciel, il n'y auroit rien en cela qui fût contraire à notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque changement de situation dans quelques-unes.

Les Etoiles dont les alternatives d'augmentation & de diminution de lumiere sont plus fréquentes, comme l'Etoile du *Col de la Baleine*, seront environnées de Planetes, dont les révolutions seront plus courtes.

L'Etoile de *Cassiopee*, & celles dont on n'a point observé d'alternatives, ne feront dérangées que par des Planetes dont les révolutions durent plusieurs siècles.

Enfin, dans des choses aussi inconnues que nous le sont les Planetes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs excentricités, les temps de leurs révolutions, les combinaisons des effets de ces Planetes les unes sur les autres, on voit qu'il n'y aura que trop de quoi satisfaire à tous les phénomènes d'apparition & de disparition, d'augmentation & de diminution de lumière.

CHAPITRE VIII.

De l'Anneau de Saturne.

APRE's avoir vû que vraisemblablement il se trouvoit dans les Cieux des Astres fort aplatis, & que ces Astres devoient produire tous les Phénomènes d'apparition de nouvelles Etoiles, & de disparition; d'augmentation & de diminution de splendeur qu'on a observée dans plusieurs; nous tirons de notre théorie l'explication d'un Phénomene qui paroît encore plus merveilleux, & qui, quoiqu'il soit l'unique de cette espece qui paroisse à nos yeux,

n'est peut-être pas l'unique qui soit dans l'Univers.

Je veux parler de l'*Anneau* qu'on observe autour de *Saturne* ; & en général des Anneaux qui se peuvent former autour des Astres.

Les Comètes ne sont , comme nous avons vû , que des Planètes fort excentriques , dont quelques-unes , après s'être fort approchées du Soleil , s'en éloignent en traversant les Orbites des Planètes plus régulières , & parcourent ainsi les différentes Régions du Ciel.

Lorsqu'elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner de longues *Queues* qui vraisemblablement sont des *Torrents*

immenses de vapeur, que l'ardeur du Soleil a fait élever de leur corps. Si une Comète dans cet état passe auprès de quelque puissante Planete, la pesanteur vers la Planete pourra détourner ce Torrent, & le déterminer à circuler autour d'elle, suivant quelque Ellipse ou quelque Cercle : & la Comete fournissant toujours de nouvelle matiere, ou celle qui étoit déjà répandue étant suffisante, il s'en formera un cours continu, ou une espece d'Anneau autour de la Planete.

Or quoique la colonne qui forme le torrent, soit d'abord cylindrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle sera

bientôt aplatie, dès qu'elle circulera avec rapidité autour de quelque Planete ou de quelque Soleil, & formera bientôt autour un Anneau mince.

Le corps même de la Comete pourra être entraîné par l'Astre, & forcé de circuler autour de lui.

Ce que j'ai dit ci-dessus des Planetes plates qui devoient se trouver dans le système du Monde, est confirmé dans notre système solaire, par les Observations qu'on a faites de l'applatiffement de Jupiter, & par notre mesure de la Terre.

A l'égard des Etoiles plates, les Phénomènes précédens paroissent nous avertir qu'il y a en

effet de ces Etoiles dans les Cieux.

Mais quant aux torrents qui circulent autour des Planetes ; nous voyons une Planete où il semble que tout se soit passé comme je viens de le dire : & l'on ne devoit pas s'étonner quand on verroit des Planetes ceintes de plusieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent se former plutôt autour des grosses Planetes que des petites ; puisqu'ils font l'effet de la pesanteur plus forte vers les grosses Planetes que vers les petites ; ils doivent aussi se former plutôt autour des Planetes les plus éloignées du Soleil , qu'autour
de

de celles qui en sont plus proches ; puisque dans ces lieux éloignés, la vitesse des Comètes se rallentit, & permet à la Planete d'exercer son action plus long-temps, & avec plus d'effet sur le Torrent.

Tout ceci est confirmé par l'expérience ; la seule Planete que nous voyons ceinte d'un Anneau, se trouve une des plus grosses, & la plus éloignée du Soleil.

Le nombre des Satellites qu'a Saturne, & la grandeur de son Anneau, peuvent faire croire qu'il les a acquis aux dépens de plusieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu'il nous paroît, soit formé

d'une quantité prodigieuse de matiere , pour pouvoir jeter sur le disque de la Planete l'ombre que les Astronomes y observent ; pendant que la matiere des queues des Cometes paroît si peu dense , qu'on voit ordinairement les Étoiles à travers. Il est vrai aussi que la pesanteur que la matiere de ces queues acquiert vers la Planete , lorsqu'elle est forcée de circuler autour , la doit condenser.

Quant aux Planetes qui ont des Satellites , sans avoir d'Anneau ; l'on voit assez que la Queue étant une chose accidentelle aux Cometes , & ne se trouvant qu'à celles qui ont été assez proches du Soleil , une

Comete sans queue pourra devenir Satellite d'une Planete , sans lui donner d'Anneau. Il est possible aussi qu'une Planete acquiere un Anneau sans acquerir de Satellite , si la Planete trop éloignée du corps de la Comete , ne peut entraîner que sa queue.

La matière qui forme ces Anneaux , au lieu de rester soutenue en forme de voute autour de la Planete , peut l'inonder de toutes parts , & former autour d'elle une espèce d'atmosphère aplatie ; & ce qui peut arriver aux Planetes , peut arriver de la même maniere aux Soleils. On prend pour une atmosphère semblable autour de notre Soleil ,

cette lumiere que M. Cassini * a observée dans le Zodiaque.

M. Newton a remarqué que la vapeur des Cometes pouvoit se répandre sur les Planetes , lorsqu'elles venoient à s'approcher ; il a cru cette espèce de communication nécessaire pour réparer l'humidité que les Planetes perdent sans cesse. Il a cru même que les Cometes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles ; & c'est ainsi qu'il explique comment une Etoile , dont la lumiere est prête à s'éteindre , si quelque Comète lui vient fournir un nouvel aliment , reprend sa pre-

* Memoires de l'Académie des Sciences , depuis 1666. jusqu'à 1699. Tome VIII.

miere splendeur. De célèbres Philosophes Anglois, M. Halley, & M. Whiston, ont bien remarqué que si quelque Comete rencontre notre Terre, elle y causeroit de grands accidents, comme des bouleversements, des déluges, ou des embrasements. Mais au lieu de ces sinistres catastrophes, la rencontre des Cometes pourroit ajouter de nouvelles merveilles, & des choses utiles à notre Terre.

F I N.





C A L C U L

*Des Figures que doivent prendre les
Fluides , qui tournent autour de
leur axe.*

SI la pesanteur se fait vers des centres suivant quelque proportion que ce soit , de quelque puissance de la distance à ces centres , nos calculs donneront les vraies figures que les Corps célestes peuvent avoir , pour chaque loi de pesanteur.

Les deux Elements d'où dépendent ces figures sont la pesanteur & la force centrifuge ; c'est de la combinaison de ces deux forces , c'est de leur plus grand ou plus petit rapport l'une à l'autre , que dépend le plus ou le moins d'aplatissement de ces corps.

Si l'on considère la pesanteur com-

me une propriété inhérente à la matiere , dont les parties s'attirent les unes les autres , suivant la loi que M. Newton a établie , & que de là naîsse la pesanteur vers les Corps célestes ; quoique la pesanteur ne se fasse plus précisément vers les centres de ces corps , & dépende de leurs quantités de matiere & de leurs figures : les corps fluides qui circulent autour d'un axe , n'en seront pas moins sujets à toutes les figures dont nous avons parlé , & à tous les aplatissements possibles.

Si , comme plusieurs Philosophes le prétendent , & comme il est assez probable , il se trouve au centre de ces Corps des Noyaux d'une matiere beaucoup plus dense que le reste , les parties hors du noyau pesant vers son centre , comme les corps pesent vers les centres des spheres au dehors desquelles ils se trouvent , & l'attraction de la matiere moins dense ne trou-

blant que très-peu cette loi, les figures que nous déterminons, différeront peu des véritables figures; & ceci doit avoir sur-tout lieu pour les fluides rares qui forment autour des corps célestes des Atmosphères.

Si l'on considère la pesanteur sous la seconde idée (Chapitre V.) c'est-à-dire, qu'on la regarde comme se faisant vers le centre, & suivant la raison renversée du quarré de la distance à ce centre. Ou si l'on considère la pesanteur comme l'effet d'une force répandue dans la matiere, par laquelle toutes ses parties s'attirent en raison renversée du quarré de leur distance, d'où résulte vers chaque Planete, pour les corps qui sont placés au-dehors, une force toute semblable à celle qui seroit dirigée vers un centre, qui seroit tomber les corps dans ce centre, & qui retiendroît les Satellites dans leurs Orbites.

Dans l'un & l'autre de ces cas, on

DES ASTRES. 137

peut déterminer pour chaque corps céleste le rapport de la pesanteur sur son Equateur à la force centrifuge , pourvu que l'Astre ait une révolution connue autour de son axe & ait quelque Satellite qui circule autour de lui , dont la distance & le temps périodique soient connus.

Voici une Proposition pour déterminer dans ces circonstances le rapport de la pesanteur à la force centrifuge.

PROPOSITION I.

Faisant le demi-diametre de l'Equateur d'un Astre = D ; le temps de sa révolution sur son axe = T ; la distance de l'Astre à quelque Planete qui circule autour de lui = Δ ; le temps périodique de cette Planete = Θ ; la pesanteur sur l'Equateur de l'Astre = P ; & la force centrifuge = F ; on a $F : P :: D^3 \Theta \Theta : \Delta^3 T T$.

138 F I G U R E

La pesanteur étant la force qui retient les Planetes dans les Orbites, les flèches des petits Arcs qu'elles décrivent dans des temps donnés, sont les quantités, dont la pesanteur les fait tomber pendant ce temps vers le centre de leurs Orbites. Et dans ces petits Arcs décrits en même-temps par différentes Planetes autour du Soleil, ou par des Satellites autour de leur Planete principale, les pesanteurs vers le Soleil ou vers les Planetes principales sont proportionnelles aux flèches des Arcs décrits. On a donc par-là le rapport de la pesanteur que chaque Planete éprouve dans le lieu où elle est vers le centre autour duquel elle se meut. On a, par exemple, le rapport de la pesanteur de Venus ou de la Terre vers le centre du Soleil, à la pesanteur de la Lune ou d'un Satellite de Jupiter ou de Saturne vers le centre de sa révolution. Et comme les pesanteurs croissent, com-

DES ASTRES. 139

me les quarrés des distances diminuent , on a le rapport de la pesanteur que Venus éprouve là où elle est , vers le centre du Soleil , à la pesanteur qu'elle éprouveroit sur sa superficie : on a le rapport de la pesanteur qu'un Satellite éprouve là où il est , vers le centre de sa Planete , à la pesanteur qu'il éprouveroit sur sa superficie.

Ce que nous disons de sa pesanteur , s'applique à la force centrifuge d'un corps placé sur l'Equateur de quelque Astre qui a une révolution autour de son axe. Les forces centrifuges sur différents Astres , sont proportionnelles aux flèches des petits Arcs décrits dans le même temps par un point de leur Equateur.

Or par les Théoremes de M. Huygens , la force centripete ou centrifuge d'un corps qui décrit un cercle , est en raison directe du rayon , & en raison inverse du quarré du temps péri-

140 F I G U R E

dique. La distance d'une Planete au centre du Soleil , ou d'un Satellite au centre de sa Planete , étant Δ , le temps de sa révolution périodique Θ , le demi-diametre de l'Astre autour duquel elle fait sa révolution étant D , la pesanteur qu'elle éprouve vers le centre de la révolution dans le lieu où elle est, sera comme $\frac{\Delta}{\Theta^2}$; & cette pesanteur augmentant en s'approchant du centre de la révolution , comme le carré de la distance diminue , on a la pesanteur que la Planete éprouve dans le lieu où elle est , à la pesanteur qu'elle éprouveroit sur la superficie de l'Astre , qui est au centre de sa révolution , comme DD à $\Delta\Delta$: d'où l'on a pour la pesanteur que la Planete , ou tout autre corps éprouveroit sur la superficie de l'Astre central , P comme $\frac{\Delta^3}{DD \Theta^2}$. On a par là les différents poids de corps égaux , placés sur le Soleil

DES ASTRES. 141

ou sur différentes Planetes.

Maintenant la force centrifuge qu'un corps éprouve, placé sur l'Équateur d'un Astre, étant en raison directe du rayon de l'Astre, & en raison inverse du quarré du temps périodique de la révolution de l'Astre autour de son axe, on a F comme $\frac{D}{TT}$. Donc $F: P :: \frac{D}{TT} : \frac{\Delta^3}{DD \Theta \Theta} :: D^3 \Theta \Theta : \Delta^3 TT$.

Scholie. Si l'on prend pour la distance moyenne de Venus au Soleil $\Delta = 15906$ demi-diametres de la Terre; pour le temps de la révolution de Venus autour de lui $\Theta = 224^j 7^h$; pour le demi-diametre du Soleil $D = 100$ demi-diamètres de la Terre; & pour le temps de la révolution du Soleil autour de son axe $T = 25^{\frac{1}{2}j}$; on trouvera $F: P$, ou $D^3 \Theta \Theta : \Delta^3 TT :: 1 : 52016$: c'est-à-dire la pesanteur sur la surface du Soleil plus de 50000. fois plus grande que la force centrifuge sur

son Equateur. Ainsi l'applatissement des Corps célestes dépendant du rapport de la force centrifuge à la pesanteur, il n'est pas étonnant qu'il soit insensible & inobservable dans le Soleil.

Si l'on prend pour la moyenne distance de la Lune à la Terre $\Delta = 60$. demi-diamètres de la Terre; pour le temps de la révolution de la Lune autour d'elle $\Theta = 27^j 7^h 43'$; pour le demi-diamètre de la Terre $D = 1$; & pour le temps de la révolution de la Terre autour de son axe $T = 23^h 56' 4''$; on trouvera la pesanteur 288 fois plus grande que la force centrifuge sur l'Equateur.

Ce rapport ne diffère presque pas de celui que M. Huygens a trouvé de 289 : 1; & qu'il a déterminé par des principes différents, s'étant servi du temps de la chute des corps, ou ce qui revient au même, de la longueur du Pendule à secondes.

DES ASTRES. 143

Si l'on prend pour la distance du quatrième Satellite à Jupiter $\Delta = 23$ demi-diametres de Jupiter, telle que M. Cassini l'a trouvée; pour le temps de la révolution de ce Satellite autour de lui $\Theta = 16^{\text{h}} 16^{\frac{8}{15}}$; pour le demi-diametre de Jupiter $D = 1$; & pour le temps de la révolution de Jupiter autour de son axe $T = 9^{\text{h}} 56'$; on trouvera $F:P :: 1:7,48$; c'est-à-dire, la pesanteur $7\frac{1}{2}$ fois plus grande que la force centrifuge sur l'Equateur de Jupiter. Aussi Jupiter est-il sensiblement applati.

Quant aux autres Planetes, Mercure, Venus, Mars, & Saturne, & toutes les Planetes secondaires, nous ne pouvons déterminer le rapport de la force centrifuge sur leur Equateur à la pesanteur. Nous ne connoissons point le temps de la révolution de Mercure autour de son axe; & cette Planete n'ayant point de Satellite, nous ne connoissons point non plus

la pesanteur des corps vers elle.

Nous connoissons les temps de la révolution de Venus & de Mars autour de leur axe , mais ces Planetes manquant de Satellites , nous ne sçaurions comparer la pesanteur des corps vers elles avec leur force centrifuge.

Nous sommes dans la même impuissance pour Saturne , & par une raison toute opposée. Nous connoissons la pesanteur des corps sur cette Planete , par le mouvement de ses Satellites : mais nous ignorons le temps de sa révolution autour de son axe : ainsi nous ne sçaurions déterminer le rapport de la force centrifuge sur son Equateur , à la pesanteur. Si l'on avoit par quelque Observation le rapport du diametre de l'Equateur de cette Planete à son axe , on pourroit déterminer le rapport de la force centrifuge à la pesanteur , & par là découvrir le temps de sa révolution.

Lorsqu'on connoîtra le rapport de
la

la pesanteur à la force centrifuge sur l'Équateur de quelque Astre, on l'employera dans le calcul de la proposition suivante pour déterminer la figure qui en résulte. Lorsqu'on ignorera ce rapport, & que l'on connoîtra la Figure; cette Figure, par le calcul suivant, pourra le faire connoître.

Enfin, lorsque ni ce rapport ni la Figure ne seront donnés, on pourra les supposer tels que l'on voudra, & il en résultera des Sphéroïdes de toute espèce.



PROPOSITION II.


TROUVER la figure d'un Sphéroïde fluide qui tourne sur son axe, en supposant que chaque partie du fluide pèse vers le centre selon quelque puissance que ce soit de la distance à ce centre?

SOLUTION.

Soit PQ l'axe de révolution; & $PAQB$ la section du Sphéroïde par l'axe. Puisque les parties du fluide sont en repos entr'elles, chaque colonne pèse également vers le centre C ; prenant donc une de ces colonnes CD , qui fait avec CP un angle dont le rayon étant $= 1$, le sinus $= h$, je la considère comme composée d'une infinité de petits cylindres Gg ; & je cherche le poids de chacun vers C .

La pesanteur absolue étant donnée en A , $= p$, pour avoir la pesanteur en G , l'on dira $p : p' :: CA'' : CG''$, d'où l'on tire la pesanteur en G , ou $p' = \frac{p \cdot CG''}{CA''}$.

Mais le mouvement de révolution im-




primant à chaque partie du fluide une force centrifuge suivant GH ; & dans les corps qui font leurs révolutions circulaires en mêmes temps, les forces centrifuges étant comme les rayons des cercles qu'ils décrivent; si la force centrifuge en A est donnée, & $=f$, pour avoir la force centrifuge en G , l'on dira $f:f::CA:LG=(\text{à cause de } LG:CG::h:1)h.CG$; d'où l'on tire la

K ij

force centrifuge en G , ou $f' = \frac{fh \cdot CG}{CA}$; mais cette force agissant suivant GH , ne diminue la force, suivant GC , que de ce qu'elle agit dans la direction opposée suivant GD . Pour trouver donc cette force suivant GD , l'on a $GH \cdot GK$, ou $1 : h :: \frac{fh \cdot CG}{CA} : f'' = \frac{fh \cdot h \cdot CG}{CA}$ = à la force qui tire le petit cylindre suivant GD .

La force qui tire le petit cylindre Gg suivant GC , n'est donc plus que $\frac{p \cdot CG^n}{CA^n} - \frac{fh \cdot h \cdot CG}{CA}$; & le poids du petit cylindre vers C , fera $\left(\frac{p \cdot CG^n}{CA^n} - \frac{fh \cdot h \cdot CG}{CA} \right) Gg$. Le poids de la colonne CG , composée de ces petits cylindres, sera donc $\int \left(\frac{p \cdot CG^n}{CA^n} - \frac{fh \cdot h \cdot CG}{CA} \right) Gg$, ou $\frac{p \cdot CG^{n+1}}{(n+1) CA^n} - \frac{fh \cdot h \cdot CG^2}{2 CA}$; & le poids de la colonne entière CD fera $\frac{p \cdot CD^{n+1}}{(n+1) CA^n} - \frac{fh \cdot h \cdot CD^2}{2 CA}$ qui doit être un poids constant A .

Si donc on fait $CA = a$, $CD = r$, l'on aura $\frac{p r^{n+1}}{(n+1) a^n} - \frac{fh h r r}{2 a} = A$; & cette équation ayant lieu, quelle que soit



h , il est clair qu'en traitant h comme variable, l'équation donnera en général le rapport entre chaque rayon CD & le sinus de l'angle qu'il forme avec l'axe PQ , & donnera par conséquent tous les points de la courbe.


Il faut maintenant déterminer la quantité constante. A . Afin que l'équation précédente appartienne à la section du Sphéroïde, dont le demi-axe $CA=a$,

K ü j

il faut que lorsque l'angle DCP est droit ;
ou lorsque $h = 1$, r soit $= a$; l'on a
donc alors $\frac{p a^{n+1}}{(n+1)a^n} - \frac{f a a}{2 a} = A$, ou
 $A = \left(\frac{2p - nf - f}{2(n+1)} \right) a$.

Ainsi l'équation corrigée sera $\frac{p r^{n+1}}{(n+1)a^n}$
 $- \frac{f h h r r}{2 a} = \left(\frac{2p - nf - f}{2(n+1)} \right) a$, ou $2 p r^{n+1}$
 $- (n+1) f h h a^{n-1} r r = (2p - nf - f) a^{n+1}$.

Cette équation détermine les sections
de tous les Sphéroïdes, quelle que soit
la puissance de la distance selon laquelle
se fait la pesanteur, excepté la seule hy-
pothèse d'une pesanteur qui seroit réci-
proquement proportionnelle à la distan-
ce au centre. Dans ce cas il faudroit re-
courir à $\int \left(\frac{p \cdot CG^n}{CA^n} - \frac{f h h \cdot CG}{CA} \right) G g$, qui
devient alors $\int \left(\frac{p \cdot CA}{CG} - \frac{f h h \cdot CG}{CA} \right) G g$,
qui n'est plus intégrable que par lo-
garithmes. L'intégrant donc, l'on a
 $p \cdot CA \cdot l CG - \frac{f h h \cdot CG^2}{2 CA}$; ou pour le



poids de la colonne entière; par

$$-\frac{f_{hhrr}}{2A} = A.$$

Pour corriger cette équation, il faut que lorsque $h=1, r=a$; l'on a donc alors $pala - \frac{fa}{2} = A$; & l'équation corrigée est $p alr - \frac{f h h r r}{2 a} = pala - \frac{fa}{2}$; ou $2 p a l \left(\frac{r}{a} \right) = \frac{f h h r r}{a} - fa$; ou, en

K iiij

152 F I G U R E

passant aux nombres , & prenant c pour le nombre dont le logarith. = 1 , l'on a


$$r. = a c \left(\frac{f h h r r}{2 p a a} - \frac{f}{2 p} \right).$$

On voit que les méridiens des Sphéroïdes sont toujours des courbes algébriques , excepté dans cette seule hypothèse.

Si l'on veut avoir l'équation de toutes ces courbes à la manière ordinaire , par rapport à des coordonnées rectangles , on la peut avoir facilement. Car faisant $C E = x$ & $D E = y$, l'on aura $r r = x x + y y$, & $h r = y$. Chassant donc h & r de l'équation généra-

$$\begin{aligned} \text{le , on a } 2 p (x x + y y)^{\frac{n+1}{2}} &= (n+1) f a^{n-1} y y = (2 p - n f - f) a^{n+1}. \text{ Et} \\ \text{pour le cas } n = -1 , x x + y y &= \\ &= a a c \left(\frac{f y y}{p a a} - \frac{f}{p} \right). \end{aligned}$$

Mais notre première manière de déterminer les courbes , par les rayons & les angles , est ici autant , ou plus commode que celle qui les détermine par les coordonnées.



Quoiqu'on traite h comme variable ; elle ne varie cependant qu'entre certaines limites , & ces limites sont 0 & 1 ; l'équation radiale ne détermine donc que l'arc de la courbe , donc l'amplitude est un angle droit : mais ces courbes étant composées de quatre arcs semblables & égaux , elles sont entièrement déterminées par notre équation.

On peut maintenant déterminer faci-

154 FIGURE


lement le rapport des deux axes de la Section, dans quelque hypothese que ce soit.

L'équation générale étant $2pr^{n+1} - (n+1)fhha^{n-1}rr = (2p - nf - f)a^{n+1}$; pour trouver r lorsque $h=0$, l'on a $2pr^{n+1} = (2p - nf - f)a^{n+1}$.

D'où l'on tire $CA : CP :: (2p)^{\frac{1}{n+1}} : (2p - nf - f)^{\frac{1}{n+1}}$.

Et dans l'hypothese d'une pesanteur en raison inverse de la simple distance, l'on a $l\left(\frac{r}{a}\right) = -\frac{f}{2p}$. D'où l'on tire $lCA - lCP = \frac{f}{2p}$.

On voit aisément que soit que n soit un nombre positif, soit qu'il soit un nombre négatif, le diamètre de l'Equateur sera toujours plus grand que l'Axe. Et qu'ainsi dans quelque hypothese que ce soit de pesanteur en raison directe ou renversée de quelque puissance de la distance, le Sphéroïde sera toujours applati vers les Poles.




Scholie. La figure des Sphéroïdes dépend, comme l'on voit, du rapport de la force centrifuge à la pesanteur. Voyons maintenant à quel point ce rapport peut varier dans quelques hypothèses de pesanteur, & quelles figures en résulteroient dans les Sphéroïdes.

Si l'on suppose la pesanteur uniforme; »

156 F I G U R E

étant = 0, l'on a $CA:CP::2p:2p-f$.
 Sur notre Terre, la force de la pesanteur est 289 fois plus grande que la force centrifuge sous l'Equateur; si donc on cherche le rapport du diametre de l'Equateur terrestre à l'axe de révolution, dans cette hypothese d'une pesanteur uniforme, mettant 289 pour p & 1 pour f , l'on aura $CA:CP::578.:577.$

La force centrifuge pourroit être égale à la pesanteur; ce qui arriveroit si la Terre tournoit sur son axe environ 17 fois plus vite qu'elle ne fait; & alors on auroit $CA:CP::2p:p::2:1$. La force centrifuge ne sçauroit être plus grande sans que les parties de la Terre se dissipassent; & si le mouvement de révolution s'accéléroit toujours, la Terre enfin seroit réduite à un seul Atome placé au centre. D'où l'on voit que dans cette hypothese d'une pesanteur uniforme, la figure la plus applatie que le Sphéroïde puisse recevoir, ne sçauroit aller qu'à rendre le diametre de son Equateur double de son axe de révolution. Dans ce cas, la Terre seroit composée de deux



Paraboloïdes; comme M. Huygens a trouvé pour cette hypothèse particulière, qui est la seule qu'il ait examinée*.

M. Herman, dans la recherche qu'il a faite de la Figure de la Terre, a suivi l'hypothèse d'une pesanteur proportionnelle à la distance au centre **. Voyons ce qui en résulteroit, & quelle forme


* Discours sur la cause de la pesanteur.

**** Phoronemia.**

elle donneroit aux Sphéroïdes.

On a alors (n étant $= 1$) $CA : CP :: \sqrt{2p} : \sqrt{(2p - 2f)} :: \sqrt{p} : \sqrt{(p - f)}$; & si la force centrifuge devenoit égale à la pesanteur, le diamètre de l'Equateur deviendroît infiniment plus grand que l'axe de révolution; c'est-à-dire, que le Sphéroïde ne seroit alors qu'un plan circulaire. Dans cette hypothese la force centrifuge pouvant être dans tous les rapports avec la force de la pesanteur, depuis 0 jusqu'à l'égalité, le diamètre de l'Equateur peut être dans tous ces rapports à l'axe de révolution. Et le Sphéroïde, qui dans cette hypothese est un Ellipsoïde, peut être tous les Ellipsoïdes depuis la Sphere jusqu'à l'Ellipsoïde le plus applati, qui ne seroit plus qu'un plan circulaire.

Si l'on suppose la pesanteur en raison inverse du quarré de la distance au centre, comme M. Newton a trouvé que les Planetes l'exercent sur les corps qui sont hors de leur solidité, l'on a $n = -2$; & $CA : CP :: (2p)^{-1} : (2p + f)^{-1}$; ou $CA : CP :: 2p + f : 2p$. D'où l'on



voit que le Sphéroïde qui s'applatit toujours d'autant plus que la force centrifuge devient plus grande, sera cependant le plus applati qu'il puisse être, lorsque le diamètre de son Equateur sera à son axe de révolution, comme 3 à 2.




PROPOSITION III.

UN Torrent de matière fluide circulant autour d'un axe hors du Torrent, par une force centripete proportionnelle à une puissance quelconque de la distance au centre ; & dans chaque section perpendiculaire à la révolution, y ayant une autre force vers un centre pris dans cette section qui soit proportionnelle à une puissance quelconque de la distance à ce centre ; déterminer la figure du Torrent ?

SOLUTION.

Soit ADP ad QA la section du Torrent qui tourne autour de l'axe $\Lambda \lambda$, faite par un plan perpendiculaire à la révolution qui passe par le centre γ . Soit γ le centre des forces centripètes pris au dehors du Torrent, & C l'autre centre pris dans la section.

Afin que les parties du fluide demeurent en équilibre, il faut que le poids de chaque colonne CD , tant celui qui résulte



sulte de la pesanteur vers γ & vers C ,
que de la force centrifuge, soit par-tout
le même.

Soit donc la pesanteur absolue en A
vers γ donnée, & $= \pi$; la pesanteur en

L


162 F I G U R E

A vers *C* donnée aussi, & $=p$; & la force centrifuge en *A* donnée, & $=f$. Soit $AC=a$, $C\gamma=b$, $CG=r$; le sinus de l'angle $DCP=h$, le rayon étant $=1$; l'on aura $GL=hr$; & ayant tiré de γ la droite γR perpendiculaire sur le rayon CD prolongé, l'on aura $CR=hb$, & $\gamma G=\sqrt{(bb+2bhr+rr)}$.

Maintenant la pesanteur en *A* vers γ étant $=\pi$; faisant $\pi:\pi'::(a+b)^m:(bb+2bhr+rr)^{\frac{1}{2}m}$, l'on aura la pesanteur en *G*, ou $\pi'=\frac{\pi(bb+2bhr+rr)^{\frac{1}{2}m}}{(a+b)^m}$; & pour avoir la force qui en résulte vers *C*, l'on dira $\pi':\pi'':G\gamma:GR$, ou $\frac{\pi(bb+2bhr+rr)^{\frac{1}{2}m}}{(a+b)^m}:\pi'':(bb+2bhr+rr)^{\frac{1}{2}}:bh+r$; d'où l'on aura la force vers *C* résultante de la pesanteur vers γ ,

$$\text{ou } \pi''=\frac{\pi(bh+r)(bb+2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{(a+b)^m}.$$

L'on a de plus (la pesanteur en *A* vers *C* étant $=p$) la pesanteur en *G* vers *C*



$= \frac{pr^3}{a^3}$; la pesanteur entiere vers C , résultante des deux pesanteurs vers γ & vers C ,

fera donc $= \frac{\pi (bh+r)(bb+2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{(a+b)^m} + \frac{pr^3}{a^3}$.

Lij

164 F I G U R E

La force centrifuge en A étant $=f$;
 si l'on fait $f:f'::a+b:b+hr$, l'on
 aura la force centrifuge en G ou $f' =$
 $=\frac{f(b+hr)}{a+b}$; & pour trouver la partie
 de cette force qui tire vers D , l'on dira
 $f:f'::GH:GK$, ou $\frac{f(b+hr)}{a+b}:f'::1:h$;
 d'où l'on tire pour la force opposée à la
 pesanteur vers C , $f' = \frac{fh(b+hr)}{a+b}$.

L'on a donc pour la force vers
 C , résultante de toutes ces forces,

$$\frac{\pi (bh+r) (bb+2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{(a+b)^m} + \frac{pr^n}{a^n} - \frac{fh(b+hr)}{a+b}.$$

Concevant donc, comme dans la pre-
 miere Proposition, la colonne CD com-
 posée d'une infinité de petits cylindres dr ,

l'on aura $\int \left[\frac{\pi (bh+r) (bb+2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{(a+b)^m} + \frac{pr^n}{a^n} - \frac{fh(b+hr)}{a+b} \right] dr$, qui doit fai-
 re un poids constant. L'on aura donc

166 . FIGURE

que , lorsque $h = 1$, l'on ait $r = a$; l'on a donc alors $\frac{\pi(a+b)}{m+1} + \frac{pa}{n+1} - \frac{fab}{a+b} - \frac{faa}{2(a+b)} = A$. Et l'équation corrigée


$$\text{sera } \frac{\pi(bb+2bhr+rr)^{\frac{m+1}{2}}}{m+1(a+b)^m} + \frac{pr^{n+1}}{(n+1)a^n} - \frac{fbhr}{a+b} - \frac{fhrr}{2(a+b)} = \frac{\pi(a+b)}{m+1} + \frac{pa}{n+1} - \frac{fab}{a+b} - \frac{faa}{2(a+b)}.$$

Ou (écrivant c pour $a+b$, & q pour $(m+1) \times (n+1)$)

$$2(n+1)\pi a^n \times (bb+2bhr+rr)^{\frac{m+1}{2}} + 2(m+1)pc^{m+1} - 2qfa^nbc^{m-1}hr - qfa^nc^{m-1}hrr = 2(n+1)\pi a^nc^{m+1} + 2(m+1)pa^{n+1}c^m - 2qfa^{n+1}bc^{m-1} - qfa^{n+2}c^{m-1}.$$

On voit que dans toutes les hypotheses la section du Torrent est une courbe algébrique , excepté dans les hypotheses d'une force vers γ ou vers C en raison simple inverse de la distance.

Car si seulement $m = -1$, l'équation de la section du Torrent sera $\frac{\pi(a+b)}{2} (bb+2bhr+rr) + \frac{pr^{n+1}}{(n+1)a^n}$



$$\begin{aligned}
 & -\frac{fbhr}{a+b} - \frac{fhrr}{2(a+b)} = \frac{\pi(a+b)}{2} l(a+b)^2 \\
 & + \frac{pa}{n+1} - \frac{fab}{a+b} - \frac{faa}{2(a+b)^2} \quad \text{Ou } \frac{\pi c}{2} \\
 & l\left(\frac{bb+2bhr+rr}{cc}\right) = -\frac{pr^{n+1}}{(n+1)a^n} + \frac{fbhr}{c}
 \end{aligned}$$

L iiij

$$+ \frac{fhhrr}{2c} + \frac{pa}{n+1} - \frac{fab}{c} - \frac{faa}{2c}.$$

Et si seulement $n = -1$, l'équation


$$\begin{aligned} \text{sera } & \frac{\pi(bb+2bhr+rr)^{\frac{m+1}{2}}}{(m+1)(a+b)^m} + palr \\ & - \frac{fbhr}{a+b} - \frac{fhhrr}{2(a+b)} = \frac{\pi(a+b)}{m+1} + pala \\ & - \frac{fab}{a+b} - \frac{faa}{2(a+b)}. \text{ Ou } pal\left(\frac{r}{a}\right) = - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\pi(bb+2bhr+rr)^{\frac{m+1}{2}}}{(m+1)c^m} + \frac{fbhr}{c} + \frac{fhhrr}{2c} \\ & + \frac{\pi c}{m+1} - \frac{fab}{c} - \frac{faa}{2c}. \end{aligned}$$

Mais si en même temps $m = -1$ & $n = -1$, l'équation sera

$$\begin{aligned} & \frac{\pi(a+b)}{2} l(bb+2bhr+rr) + palr \\ & - \frac{fbhr}{a+b} - \frac{fhhrr}{2(a+b)} = \frac{\pi(a+b)}{2} l(a+b)^2 \\ & + pala - \frac{fab}{a+b} - \frac{faa}{2(a+b)}. \text{ Ou } \frac{\pi c}{2} \\ & l\left(\frac{bb+2bhr+rr}{cc}\right) + pal\left(\frac{r}{a}\right) = \frac{fbhr}{c} \\ & + \frac{fhhrr}{2c} - \frac{fab}{c} - \frac{faa}{2c}. \end{aligned}$$

Si l'on veut avoir l'équation de la section du Torrent par rapport aux coordonnées rectangles ; faisant $CE = x$ &



$DE=y$, l'on aura les deux équations $rr=xx+yy$, & $hr=y$; par le moyen desquelles on chassera r & h des équations précédentes, & l'on aura pour le cas général

$$2(n+1)\pi a^n(bb+2by+yy$$

$$+xx)^{\frac{n+1}{2}} + 2(m+1)pc^m(xx+yy)^{\frac{n+1}{2}} \\ - 2qfa^nb^{m-1}y - qfa^nc^{m-1}yy \\ = 2(n+1)\pi a^nc^{m+1} + 2(m+1)pa^{n+1} \\ c^m - 2qfa^{n+1}b^{m-1} - qfa^{n+2}c^{m-1}.$$

On trouvera de la même manière les équations aux coordonnées rectangles, dans les cas $m = -1$ & $n = -1$.


On trouvera la courbe PaQ comme nous avons trouvé PAQ , en observant les changements convenables.

Car alors si la pesanteur en a vers γ est donnée & $=\pi$, la pesanteur en a vers $C=p$, la force centrifuge en $a=f$, $Ca=a$, $C\gamma=b$, $Cg=r$, $gl=hr$, $Cr=bh$ & $\gamma g = \sqrt{(bb-2bhr+rr)}$; l'on trouvera la pesanteur en g vers C résultante de la pesanteur vers γ ,

$$\pi^n = \frac{\pi(bh-r)(bb-2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{(b-a)^m}.$$

On a de plus la pesanteur en g vers C , $p' = \frac{pr^n}{a^n}$.

L'on trouvera aussi la partie de la



force centrifuge qui résulte en g vers C , $F = \frac{fh(b-hr)}{b-a}$.

Mais ces deux dernières forces sont maintenant opposées à la première ; on


$$\text{aura donc } \int \left[\frac{\pi(-bh+rr)(bb-2bhr+rr)^{\frac{m+1}{2}}}{(b-a)^m} + \frac{pr^n}{a^n} + \frac{f^h(b-hr)}{b-a} \right] dr = A. \text{ D'où}$$

$$\begin{aligned} \text{l'on tire } & \frac{\pi(bb-2bhr+rr)^{\frac{m-1}{2}}}{m+1(b-a)^m} + \frac{pr^{n+1}}{(n+1)a^n} \\ & + \frac{fbhr}{b-a} - \frac{fhhrr}{2(b-a)} = \frac{\pi(b-a)}{m+1} + \frac{pa}{n+1} \\ & + \frac{fab}{b-a} - \frac{faa}{2(b-a)}. \end{aligned}$$

Et dans les cas $m = -1$, $n = -1$, l'on trouvera, comme ci-dessus, les équations des sections, qui ne différeront que par le changement de quelques signes.

Par ces équations radiales, on trouvera des équations aux coordonnées, comme on a fait pour la courbe PAQ .

Et le poids de la colonne, tant dans la courbe supérieure que dans l'inférieure, devant toujours être le même, on aura une équation entre le poids A dans la courbe supérieure, & le poids A dans l'inférieure, par laquelle on trouvera le rapport entre Ca & CA ; & l'on déterminera ainsi la section entière du Torrent.




Scholie. Quelle que soit l'hypothese de pesanteur, on pourra toujours, pour un certain angle DCP , faire enforte que le rayon CD soit d'une longueur donnée. Et par-là on pourra rendre la fi-

gure du Torrent plus ou moins applatie d'une infinité de manières, en mettant dans l'équation, pour h & r , des valeurs déterminées. L'on pourra ainsi faire en sorte que les points P & Q s'unissent en C , en mettant 0 pour h & r ; & alors la section du Torrent sera composée de deux figures ovales jointes en C . Car on trouvera une infinité de rapports entre π , p & f , qui donneront cette figure.

Si par exemple, on veut que les points P & Q tombent en C ; l'on aura $2(n+1) \pi b^{m+1} = 2(n+1) \pi c^{m+1} + 2(m+1) p a c^m - 2 q f a b c^{m-1} - q f a a c^{m-1}$. D'où l'on tirera une infinité de rapports entre π , p & f .

Si l'on suppose la pesanteur tant vers γ que vers C , proportionnelle à la simple distance au centre; la section du Torrent sera une section conique. Et si l'on exige de plus que les points P , Q & C s'unissent, la figure sera composée de deux Ellipses joints en C .

Maintenant si la distance $C \gamma$ s'évanouit, ou si les deux centres s'unissent, l'on aura $b = 0$ & $c = a$; & le Torrent



deviendra un Sphéroïde.

Ou si l'on suppose $m = n$ & $\pi = 0$;
 l'équation générale de la section du
 Torrent deviendra $2pr^{n+1} - (n+1)$
 $f a^{n-1} h h r r = (2p - n f - f) a^{n+1}$. Ou

176 FIGURE DES ASTRES.

dans le cas $n = -1$; $2 p a l \left(\frac{r}{a} \right) = \frac{f h h r r}{a}$
 $- f a$, comme on a trouvé dans la précédente Proposition qui n'est qu'un cas particulier de celle-ci.

FIN.

401 14648





6th





